

اطلاعات دارویی (۲)

از فراگیر انتظار میرود با مطالعه این جزوه با :

- طبقه بندی مصرف در حاملگی و شیر دهی
 - نکات قابل توصیه به بیمار
 - موارد احتیاط
 - و موارد مصرف
- برخی از داروهای طرح پزشك خانواده آشنا شوند .

تهیه شده در :

واحد دارویی معاونت بهداشتی استان همدان

تابستان ۱۳۹۱

فهرست

شماره صفحه	نام دارو	شماره صفحه	نام دارو
33	لووتیروکسین	1	آسیکلوویر
35	متوکلوپرامید	2	آدلت کلد
37	متوکارپامول	3	آمینوفیلین
38	مبندازول	5	آنتونول
39	نفازولین	6	پاکلوفن
40	نفازولین + آنتازولین	7	کاربامازپین
41	انگرازپام	9	کاپتوپریل
42	فنازوپریدین	11	کلسیم دی
43	پروپرانول	12	کلرام فنیکل
45	بتادین	13	کلوتریمازول جلدی
46	پردنیزولون	14	کلوتریمازول واژینال
47	ریفامپین	15	کوآموکسی کلاو
49	سالیوتامول	17	کلردیازپوکساید
50	استرپتومایسین	19	کلونازپام
51	سولفاستامید	21	دیپیردامول
52	سیلورسولفادیازین	23	دیازپام
53	تریپل سولفا	25	دیمن هیدرینات
54	تیوریدازین	26	ارگوتامین سی
56	تری هگزیفنیدیل	27	انالپریل
57	تریامتین اچ	28	فلوکستین
58	ویتامین ب ۱۲	29	فورازولیدون
59	ویتامین ب ۱	30	جم فیبروزیل
60	معنی اصطلاحات	31	ایمی پرامین

ACYCLOVIR (Ophthalmic, Topical) h

Alovir, Biocyclovir, Zovirax

طبقه‌بندی فارماکولوژیک : نوکلئوزید پورین صنعتی

طبقه‌بندی درمانی : ضدویروس

طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

فرآورده‌های ژنریک ایران

Ophthalmic Ointment: 3%

Topical Cream: 5%

اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

هرپس ژنیتالیس ناشی از HSV؛ عفونتهای اولیه و راجعه غیرمخاطره‌آمیز هرپس ساده جلدی - مخاطی در بیماران که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند

آموزش بیمار / خانواده

- موضعی:** هنگام استفاده موضعی از پماد، برای جلوگیری از انتقال آلودگی به سایر نقاط بدن بیمار، یا پخش عفونت به افراد دیگر از پوششهای پلاستیکی روی انگشت یا دستکش استفاده نمائید. ناحیه مبتلا باید خشک و تمیز نگهداری شود و برای پیشگیری از تحریک پوستی باید از لباس گشاد استفاده نمائید.
- از تماس دارو با پوست دور چشم یا وارد شدن آن به داخل چشم باید جلوگیری شود و بروز هر علامت غیرمعمول چشمی را به پزشک اطلاع دهید، زیرا عفونت تبخال چشم می‌تواند منجر به کوری شود.
- بیمار باید هنگام تماس جنسی از کاندوم استفاده نماید و یا تا برطرف شدن کامل ضایعات از هرگونه تماس جنسی پرهیز نماید.
- باید بر اهمیت حفظ بهداشت دهان، معاینات منظم دوره‌ای دندانپزشکی در پیشگیری از حساسیت، خونریزی و هیپرپلازی لثه‌ها تأکید نمود.
- با توجه به اینکه زنان مبتلا به تبخال تناسلی در ریسک بیشتری از نظر ابتلا به سرطان دهانه رحم می‌باشند، باید به این افراد آموخت که سالی یکبار جهت انجام آزمون پاپ اسمیر مراجعه نمایند.

ADULT COLD h

Anacold, Dristan AF, Corisan, Exacold, Griphen Adult, Lorizan, Minacold

طبقة‌بندی فارماکولوژیک: ترکیب استامینوفن، فنیل‌افرین و کلرفنیرامین

طبقة‌بندی درمانی: برطرف کننده علائم سرماخوردگی

طبقة‌بندی مصرف در حاملگی: گروه C

فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets or Capsules:

Acetaminophen 325 mg and

Phenylephrine HCl 5 mg and

Chlorpheniramine Maleate 2 mg

Capsules:

Acetaminophen 325 mg and

Pseudoephedrine Hcl 30mg

اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

تسکین علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا؛ سینوزیت؛ تب یونجه

بالغین: دو قرص هر ۴ تا ۶ ساعت مصرف می‌شود. حداکثر دوزاژ روزانه ۱۲ قرص است.

کودکان ۶ تا ۱۲ سال: یک قرص هر ۴ ساعت مصرف می‌شود. حداکثر دوزاژ روزانه ۶ قرص است.

جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Acetaminopen و Phenylephrine HCl و

Chlorpheniramine Maleate مراجعه نمایید.

AMINOPHYLLINE (Hydrose) h

Aminodic, Amoline, Phyllocontin, Somophylline, Truphylline

طبقة بندی فارماکولوژیک : مشتقات گزانتین

طبقة بندی درمانی : گشادکننده برونش

طبقة بندی مصرف در حاملگی : گروه C

❖ فرآورده های ژنریک ایران

Injection: 25 mg/ml (10 ml)

مقدار ۲۰۰ mg آمینوفیلین ابدار تقریباً معادل ۱۵۸mg آمینوفیلین بدون آب است.

❖ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

بهبود علایم برونکواسپاسم

بیمارانی که در حال حاضر تنوفیلین مصرف نمی کنند و نیاز به بهبود علایم برونکواسپاسم دارند:

❖ درمان کمکی در آپنه نوزادان

درمان حملات دیس پنه شبانه یا آپنه پریودیک همراه با تنفس شین - استوک

کاهش شدت برونکواسپاسم در نوزادان مبتلا به سیستیک فیبروزیس

❖ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

- کنتراندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط به گزانتین ها ● آریتمی کنترل نشده ● هیپوتیروئیدی.
- موارد احتیاط: ○ نارسایی احتقانی قلب ○ بیماریهای کبدی ○ دیابت ○ گلوکوم ○ هیپرتانسیون ○ هیپرتیروئیدیسم ○ زخم پپتیک ○ ریفلاکس گاستروازوفازیا.

دیس پنه : تنفس مشکل

آپنه پریودیک : قطع تنفس گذرشی

🔗 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ آنفوزیون سریع وریدی ممکن است منجر به ایست قلبی شود. میزان آنفوزیون دارو را به دقت کنترل نمایید.
- ✓ در صورت تغییر رنگ و یا وجود کریستال در محلول، از مصرف آن خودداری نمایید.
- ✓ فقط محلول های ۲۵mg/ml دارو را می توان بدون رقیق نمودن، تجویز کرد. اما توصیه می شود که جهت کاهش احساس سوزش در محل تزریق، رقیق سازی بیشتر حداقل با ۱۰۰-۲۰۰ ml از D5W انجام شود.
- ✓ تجویز دارو در نوزادان کوچکتر از ۶ ماه توصیه نمی شود.
- ✓ دارو باید در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری شود.

🔗 آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☑ بیمار را به قطع مصرف سیگار تشویق نمایید.
- ☑ به بیمار توصیه کنید از مصرف داروهای ضدسرفه، ضدسرماخوردگی بدون مشورت با پزشک پرهیز نماید.
- ☑ به بیمار توصیه کنید مصرف غذاها و نوشابه های حاوی گزانتین را به حداقل برساند.

🔗 مصرف در دوران شیردهی

آمینوفیلین در شیر مادر ترشح می شود و ممکن است باعث تحریک پذیری، بی خوابی در شیرخوار گردد.

ATENOLOL h

Apo-Atenol, Normopress, Tenormin, Telormin

طبقة بندی فارماکولوژیک : مسدودکننده گیرنده بتا - آدرنرژیک

طبقة بندی درمانی : ضد هیپرتانسیون، ضد آنژین صدری

طبقة بندی مصرف در حاملگی : گروه C

✎ فرآورده های ژنریک ایران

Scored Coated Tablets: 50 mg

Scored Coated Tablets: 100 mg

✎ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

هیپرتانسیون

آنژین صدری پایدار مزمن

دوزاژ در نارسایی کلیه

✎ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط ● نارسایی قلبی ● بلوک دهلیزی - بطنی درجه دو یا سه ● ش
کار دیورتیک ● ادم ریوی

موارد احتیاط: ○ اختلال عملکرد کلیه ○ نارسایی عروق کرونر ○ بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس ○ بیماران
به هیپرتیروئیدی ○ بیماران مبتلا به برونکواسپاسم (آسم یا آمفیزم)

✎ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ در صورت نیاز می توان قرص را قبل از مصرف خرد و همراه مایعات مصرف کرد.
✓ دارو را در ظرف دربسته و مقاوم به نور و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمایید.

✎ آموزش بیمار / خانواده

خوراکی: ☒ به بیمار بیاموزید علیرغم احساس بهبودی، دارو را طبق تجویز مصرف نماید و در صورت فراموش کردن یک نوبت آن از حذف یا دو برابر نمودن دوز بعدی بپرهیزد. نوبت فراموش شده را می توان تا ۸ ساعت قبل از نوبت بعدی مصرف نمود. قطع ناگهانی دارو باعث بروز ناگهانی آریتمی های کشنده، هیپوتانسیون یا ایسکمی میوکارد می گردد.

☒ به بیمار توصیه کنید به منظور جلوگیری از بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک از تغییر وضعیت ناگهانی بپرهیزد.

☒ به بیمار توضیح دهید که مصرف آتنولول سبب افزایش حساسیت نسبت به سرما می گردد.

✎ مصرف در دوران شیردهی

بی خطر بودن مصرف آن ثابت نشده است. استفاده از روشهای تغذیه ای دیگر در دوران درمان توصیه می شود.

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مشتقات کلروفنیل

• طبقه‌بندی درمانی : شل‌کننده عضلات اسکلتی

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

❖ فرآورده‌های ژنریک ایران

Scored Tablets: 10 mg

Scored Tablets: 25 mg

❖ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

اسپاستیسیتی در مولتیپل اسکلروزیس و سایر ضایعات نخاعی

❖ کنترل اندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

- کنترل اندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط.
- موارد احتیاط : ○ اختلال عملکرد کلیه ○ اولسر پپتیک ○ ضایعات مغزی ○ CVA ○ دیابت ○ صرع ○ بیماران که از حالت اسپاسمی خود جهت حفظ تعادل و وضعیت گرفتن استفاده می‌کنند ○ دوران بارداری و شیردهی ○ اطفال.

❖ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را باید در ظروف در بسته و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمود.

پیگیری و بررسی تأثیر دارو:

✓ در شروع درمان کاهش اسپاستیسیتی ناشی از دارو ممکن است باعث اشکال در توانایی ایستادن و راه رفتن بیمار گردد.

✓ در خلال درمان فشارخون، وزن، قندخون و تست‌های عملکرد کبدی را کنترل نمایید.

✓ افراد مسن نسبت به عوارض جانبی این دارو حساس‌ترند.

❖ آموزش بیمار / خانواده

خوراکی: ☒ به بیمار تذکر دهید از قطع ناگهانی دارو بپرهیزد زیرا باعث ایجاد سندروم محرومیت (توهم، افزایش حالت اسپاسم عضلانی، تشنج، تغییرات ذهنی و روانی و بیقراری) می‌گردد.

☒ به بیمار توصیه نمایید جهت پیشگیری از بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک از تغییر وضعیت ناگهانی بپرهیزد.

☒ مصرف این دارو ممکن است باعث سرگیجه و خواب‌آلودگی گردد؛ به بیمار توصیه کنید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☒ به بیمار گوشزد نمایید از مصرف همزمان این دارو با الکل و سایر داروهای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی بپرهیز نماید.

❖ مصرف در دوران شیردهی

اگر چه ترشح با کلوفن در شیر مادر ثابت نشده است، با این وجود منافع دارو در برابر مضار آن باید سنجیده شود.

CARBAMAZEPINE h

Carbaram, Epitol, Mazepine, Tegretol

طبقة بندی فارماکولوژیک : مشتقات ایمینوستیلین

طبقة بندی درمانی : ضد تشنج، ضددرد

طبقة بندی مصرف در حاملگی : گروه D

❖ فرآورده های ژنریک ایران

Scored Tablets: 200 mg

Sustained Release: 200 mg

Sustained Release: 400 mg

Oral Suspension: 100 mg/5 ml

❖ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

تشنج ژنرالیزه تونیک - کلونیک (گراندمال): تشنج کمپلکس پارشیل (سایکوموتور)

نورالژی تری ژمینال

درمان اختلالات دوقطبی

بیماره گره

Restless Leg سندرم

دوز نگهدارنده خوراکی جهت کنترل سریع تشنج

❖ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط به این دارو و ضدافسردگیهای سه حلقه ای ● بیمار با سابقه دپرسیون مزه استخوان ● بیمارانی که از داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز استفاده می نمایند.
موارد احتیاط: ○ بیماریهای قلبی - عروقی ○ بیماریهای کبدی ○ بیماریهای کلیوی ○ افزایش فشار داخل
○ تشنج ○ سایکوز ○ افراد مسن و ناتوان.

🔹 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ حداقل تا ۱۴ روز بعد از مصرف دارو، از تجویز داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز پرهیز نمایید.
- ✓ بهتر است دارو را همراه با غذا مصرف نمود.
- ✓ دارو را باید در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمود.

🔹 آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☐ مصرف این دارو باعث سرگیجه و خواب‌آلودگی می‌گردد. به بیمار توصیه کنید تا مشخص نشدن از دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ☐ به بیمار آموزش دهید، در صورت بروز تب، گلودرد، پتشی، خونریزی غیرمعمول، درد شکم، لرز، بی‌رنگ شدن مدفوع یا زردی پوست سریعاً به پزشک مراجعه نماید.
- ☐ به بیمار توصیه کنید در زمان مصرف کاربامازپین از روشهای غیرهورمونی پیشگیری از بارداری استفاده کند.

🔹 مصرف در دوران شیردهی

مقادیر قابل ملاحظه‌ای از کاربامازپین در شیر ترشح می‌شود. در خلال درمان باید از روشهای دیگر جهت تغذیه شیرخوار استفاده شود.

گراندمال : صرع بزرگ که با بیهوشی همراه است

تشنج ژنرالیزه تونیک - کلونیک : تشنج عمومی دارای حالت انقباضی مداوم و انقباضها و انقباضهای مکرر

نورالژی تری ژمینال : التهاب عصب سه قلو (عصب گونه ای)

بیماری کره : بیماری ارثی با مشخصه لرزش و زوال عقل

CAPTOPRIL h

Capoten, Captotril, Tenopril

- طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مهارکننده آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین (ACE)
- طبقه‌بندی درمانی : ضد هیپرتانسیون، داروی کمکی در درمان نارسایی احتقانی قلب
- طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C (در سه ماهه دوم و سوم حاملگی: گروه D)

✎ فرآورده‌های ژنریک ایران

Scored Tablets: 25 mg

Scored Tablets: 50 mg

✎ اندیکاسیون‌ها، راد مصرف و دوزاژ

هیپرتانسیون خفیف تا شدید، ادم ایدیوپاتیک، پدیده رینود
اختلال عملکرد بطن چپ بعد از انفارکتوس میوکارد

پیشگیری از نفروپاتی دیابتی

نارسایی احتقانی قلب (CHF)

✎ کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط به این دارو و سایر مهارکننده‌های ACE .
موارد احتیاط : ○ اختلال عملکرد کلیه ○ بیماریهای کلاژن واسکولار ○ بیماریهای سیستم ایمنی.

✎ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ کاپتوپریل را بهتر است یکساعت قبل از غذا مصرف نمود. غذا باعث کاهش جذب دارو به میزان ۳۰-۴۰٪ می‌شود.
- ✓ دارو را باید در ظروف مقاوم در برابر نور و درجه حرارت زیر ۳۰C نگهداری نمود.

✎ آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☐ به بیمار پیاموزید، علیرغم احساس بهبودی دارو را کاملاً مطابق دستور مصرف نماید و دوز فراموش شده را بلافاصله پس از بخاطر آوردن مصرف کند، مگر اینکه فرصتی تا زمان مصرف دوز بعدی وجود نداشته باشد. همچنین از دو برابر نمودن دوزهای دارو پرهیز کند.
- ☐ به بیمار تذکر دهید از مصرف جانشین‌شونده‌های نمک یا غذاهای حاوی سدیم یا پتاسیم بدون مشورت با پزشک خودداری نماید.
- ☐ به بیمار توضیح دهید که مصرف این دارو ممکن است باعث اختلال چشایی گردد که معمولاً علیرغم ادامه درمان بطور خودبخود ظرف ۸-۱۲ هفته برطرف می‌گردد.
- ☐ به بیمار توضیح دهید جهت پیشگیری از بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک، خصوصاً پس از مصرف اولین دوز دارو، از

تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نماید. همچنین تذکر دهید انجام تمرینات بدنی یا قرار گرفتن در آب و هوای گرم باعث تشدید اثرات هیپوتانسیون دارو می‌گردد.

☒ مصرف این دارو باعث سرگیجه می‌شود، به همین جهت به بیمار توصیه نمایید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☒ به بیمار بیاموزید در صورت بروز راش، خشکی دهان، گلودرد، تورم دستها یا پاها، بی‌نظمی ضربانات قلب، درد قفسه سینه، سرفه‌های خشک، تورم صورت، چشمها، لبها و زبان و یا اشکال در تنفس به پزشک اطلاع دهد.

☞ مصرف در دوران شیردهی

کاپتوپریل در شیر مادر ترشح می‌شود، ولی اثرات آن روی شیرخوار مشخص نیست. مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.

نفروپاتی دیابتی : اختلال در کار کلیه بیماران دیابتی	پر تانسینون : فشار خون بالا
	ایدیوپاتیک : ناشناخته
	نفروپاتی : اختلال کار کلیه

CALCIUM-D h

Calcibon, Calci-D, Calcidex, Cal-D-Kal, Osteo-D, Vitacalcic

طبقه‌بندی فارماکولوژیک : ترکیب کلسیم و ویتامین D

طبقه‌بندی درمانی : مکمل غذایی

❖ فرآورده‌های ژنریک ایران

Film Coated Tablets:

Calcium 500 mg(as Carbonate) and

Vitamin D 200 I.U.

❖ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

بالغین و کودکان : روزانه یک قرص یا طبق دستور پزشک مصرف می‌شود.

CHLORAMPHENICOL (Ophthalmic) h

Chloribiotic, ChloroFair, Chloroptic, I-Chlor, Ophthochlor

طبقة بندی فارماکولوژیک : مشتقات دی کلرواستیک اسید

طبقة بندی درمانی : آنتی بیوتیک

طبقة بندی مصرف در حاملگی : گروه C

❖ فرآورده های ژنریک ایران

Sterile Eye Drops: 0.5%

❖ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

عفونتهای باکتریال سطحی ملتحمه و قرنیه ناشی از ارگانیزمهای حساس
بالغین و کودکان: یک قطره از دارو، هر یک تا ۴ ساعت به داخل چشم چکانده می شود.

❖ کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیونها: ● عفونتهای خفیف (آنفلوآنزا) ● عفونتهای دهانی و سرماخوردگی ● بعنوان پروفیلاکسی
برابر عفونتهای حساسیت مفرط یا سابقه واکنش توکسیک به این دارو.
موارد احتیاط: ○ اختلال عملکرد کلیه یا کبد ○ پورفیری حاد ○ کمبود آنزیم گلوکز ۶- فسفات دهیدروژناز (G6 PD)

❖ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ داروی خوراکی باید همراه با یک لیوان آب و معده خالی (یک ساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا) تجویز شود.
- ✓ جهت تزریق وریدی ۱g از دارو را با ۱۰ml آب استریل تزریقی و یا دکستروز ۵٪ رقیق و به صورت مستقیم حداقل در خلال یک دقیقه تزریق نمائید.
- ✓ جهت انفوزیون، دارو را با ۱۰۰-۵۰۰ml از محلول دکستروز ۵٪ رقیق و در خلال ۳۰-۶۰ دقیقه انفوزیون نمائید.
- ✓ در صورت نگهداری محلول در درجه حرارت پائین ممکن است کریستال تشکیل گردد. قبل از تزریق حتماً محلول را تکان داده و در صورت کدر بودن رنگ محلول، از تزریق آن خودداری نمائید.
- ✓ در صورت مصرف قطره چشمی، بعد از چکاندن دارو، یک تا دو دقیقه روی مجرای اشکی فشار دهید تا از جذب سیستمیک دارو جلوگیری به عمل آید.
- ✓ دارو را باید در درجه حرارت ۱۵-۳۰°C نگهداری نمود.

❖ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ بیمار لازم است دوز فراموش شده را بلافاصله پس از به خاطر آوردن مصرف نماید؛ مگر اینکه فرصتی تا زمان مصرف دوز بعدی وجود نداشته باشد؛ همچنین از دو برابر نمودن دوز دارو در نوبتهای بعدی

❖ مصرف در دوران شیردهی

دارو با غلظتهای کم در شیر ترشح می شود. در خلال درمان با این دارو مصرف شیر مادر جهت شیرخوار توصیه

CLOTRIMAZOLE (Topical) h

Canazole, Clozymax, Lotrimin, Mycelex

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مشتقات صنایع ایمیدازول

• طبقه‌بندی درمانی : ضدقارچ موضعی

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه B

• فرآورده‌های ژنریک ایران

Topical Cream: 1%

Topical Solution: 1% (20 mL)

• اندیکاسیون‌ها: راه مصرف و دوزاژ

تیناپدیس، تیناکروریس، تیناورسیکالر، تیناکوریورس، کاندیدیاژ جلدی

• کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط.
موارد احتیاط: ○ اختلال عملکرد کبد.

• توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمایید.

• آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار پیاموزید دوز فراموش شده را در اولین فرصت مصرف نماید. همچنین از دو برابر نمودن دوزهای بعدی پرهیز نماید.

موضعی: ☒ به بیمار مبتلا به عفونت قارچی پوست پیاموزید از لباسها و جورابهایی سبک، نرم و گشاد استفاده نمودن لباسهایش را جدا از سایر افراد خانواده شستشو داده و پوستش را تمیز و خشک نگاه دارد.

• مصرف در دوران شیردهی

مشخص نشده است که این دارو در شیر ترشح می‌شود، ولی در هر صورت این دارو را در دوران شیردهی باید با

احتیاط

تجویز کرد.

CLOTRIMAZOLE (Vaginal) h

Clotizol, Gyne-Lotrimin, Lotrimin, Mycelex, Mycelex-G

طبقة بندی فارماکولوژیک : مشتقات صنایع ایمیدازول

طبقة بندی درمانی : ضدقارچ موضعی

طبقة بندی مصرف در حاملگی : گروه B

❖ فرآورده های ژنریک ایران

Vaginal Cream: 1%

Vaginal Cream: 2%

Vaginal Tablets: 100 mg

Vaginal Tablets: 500 mg

Vaginal Suppository: 100 mg

Vaginal Suppository: 200 mg

Vaginal Suppository: 500 mg

❖ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

کاندیدیاز و لوواژینال

❖ کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط.
موارد احتیاط: ○ اختلال عملکرد کبد ○ سه ماهه اول حاملگی.

❖ آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☑ به بیمار بیاآموزید دوز فراموش شده را در اولین فرصت مصرف نماید، همچنین از دو برابر نمودن دوزهای بعدی پرهیز نماید.
- واژینال: ☑ به بیمار بیاآموزید جهت پیشگیری از آلودگی و رنگی شدن لباسها از نوارهای بهداشتی استفاده نماید.
- ☑ به بیمار بیاآموزید مصرف واژینال این دارو باعث تحریک خفیف پوستی در زوج مقابل می گردد، بنابراین یا از آمیزش در طی درمان پرهیز نموده و یا همسرش از کاندوم استفاده نماید.
- ☑ تأکید شود که فرآورده واژینال باید مطابق دستور مصرف شود، حتی اگر قاعدگی شروع شده باشد.

❖ مصرف در دوران شیردهی

مشخص نشده است که این دارو در شیر ترشح می شود، ولی در هر صورت این دارو را در دوران شیردهی باید با احتیاط تجویز کرد.

CO-AMOXICLAV h

Augmentin, Clavacillin, Clavulin, Co-Amoxiclav Farabi, Farmentin-BD, Far-Co-Amoxiclav

طبقه بندی فارماکولوژیک : ترکیب آمینوپنی سیلین و مهارکننده بتالاکتاماز

طبقه بندی درمانی : آنتی بیوتیک

طبقه بندی مصرف در حاملگی : گروه B

فرآورده های ژنریک ایران

Co- Amoxiclav 156

For Oral Suspension:

Amoxicillin 125 mg/5 ml (as Trihydrate) and

Clavulanic Acid 31.25 mg/5 ml (as Potassium Salt)

For Oral Suspension:

Amoxicillin 125 mg/Sachet (as Trihydrate) and

Clavulanic Acid 31.25 mg/Sachet (as Potassium Salt)

Co- Amoxiclav 228

For Oral Suspension:

Amoxicillin 200 mg/5 ml (as Trihydrate) and

Clavulanic Acid 28.5 mg/5 ml (as Potassium Salt)

Co- Amoxiclav 312

For Oral Suspension:

Amoxicillin 250 mg/5 ml (as Trihydrate) and

Clavulanic Acid 62.5 mg/5 ml (as Potassium Salt)

For Oral Suspension:

Amoxicillin 250 mg/Sachet (as Trihydrate) and

Clavulanic Acid 62.5 mg/Sachet (as Potassium Salt)

Co- Amoxiclav 375

Film Coated Tablets:

Amoxicillin 250 mg (as Trihydrate) and

Clavulanic Acid 125 mg (as Potassium Salt)

Co- Amoxiclav 457

For Oral Suspension:

Amoxicillin 400 mg/5 ml (as Trihydrate) and :

Clavulanic Acid 57mg/5 ml (as Potassium Salt)

Co- Amoxiclav 625

Film Coated Tablets:

Amoxicillin 500 mg (as Trihydrate) and

Clavulanic Acid 125 mg (as Potassium Salt)

❖ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

عفونت قسمت تحتانی دستگاه تنفس؛ اوتیت میانی؛ سینوزیت؛ عفونتهای پوستی؛

عفونتهای دستگاه ادراری ناشی از ارگانیسمهای حساس

❖ کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط به هریک از انواع پنی‌سیلین‌ها یا سفالوسپورین‌ها ● بیماران مبتلا به منونوکلئوز عفونی.
موارد احتیاط: ○ اختلال عملکرد کلیه.

❖ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را می‌توان قبل و یا بعداز غذا تجویز نمود.

✓ بعداز تهیه سوسپانسیون خوراکی، دارو را می‌توان تا ۱۰ روز در یخچال نگهداری نمود.

✓ قرص‌های دارو را باید در ظروف درسته مقاوم به نور و درجه حرارت کمتر از C24 نگهداری نمود.

❖ آموزش بیمار / خانواده

خوراکی: ☒ به بیمار بیاموزید دوره درمان را کامل نماید.

☒ به بیمار دیابتی تذکر دهید که قند ادرار خود را در طی درمان بطور مرتب کنترل نماید.

❖ مصرف در دوران شیردهی

آموکسی‌سیلین و کلاوولانات هر دو در شیر مادر ترشح می‌شوند، مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط

صورت گیرد.

CHLORDIAZEPOXIDE h

Libri tabs, Librium, Lipoxide, SK-Lygen, Murcil, Reposans-IO, Sereen

طبقة بندی فارماکولوژیک : بنزودیازپین

طبقة بندی درمانی : ضد اضطراب، ضد تشنج، آرام بخش - خواب آور

طبقة بندی مصرف در حاملگی : گروه D

فرآورده های ژنریک ایران

Coated Tablets: 5 mg

Coated Tablets: 10 mg

اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

اضطراب و tension خفیف تا شدید

اضطراب و tension شدید

علائم سندرم قطع مصرف در الکلیسم حاد

جلوگیری از اضطراب قبل از جراحی

کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط ● گلوکوم حاد زاویه باریک و یا گلوکوم زاویه باز درمان نشده ● شوک کوم

● مسمومیت حاد با الکل ● نوزادان کوچکتر از ۳۰ روز ● موارد احتیاط: ○ سایکوز ○ میاستنی گراو یا پارکینسون ○ اختلال عملکرد کلیه و کبد ○ بیماران سالخور

🔍 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ بهتر است دارو را همراه و یا بلافاصله بعد از مصرف غذا تجویز نمود. در صورت مصرف همزمان آنتی اسید جهت جلوگیری از تأخیر جذب دارو باید آنتی اسید را یک ساعت قبل و یا بعد از مصرف کلردیازپوکساید مصرف نمود.
- ✓ دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمایید.

🔍 آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☒ به بیمار توصیه نمائید در صورت کم بودن تأثیر دارو پس از گذشت یک هفته از درمان، پزشک مطلع ساخته و از افزایش دوز دارو بدون مشورت با پزشک پرهیز نماید. جهت قطع درمانهای طولانی مدت لازم است مقدار دارو بطور تدریجی کاهش داده شود. قطع ناگهانی دارو باعث بروز علائم سندرم محرومیت می گردد.
- ☒ مصرف این دارو منجر به خواب آلودگی و سرگیجه خواهد شد. به بیمار توصیه نمائید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر اموری که نیازمند هشیاری می باشند، پرهیز نماید.
- ☒ به بیمار توصیه نمائید در هنگام درمان با این دارو از مصرف داروهای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی پرهیز نماید.

🔍 مصرف در دوران شیردهی

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

CLONAZEPAM h

Klonopin, Rivapam, Rivotril

طبقة بندی فارماکولوژیک : بنزودیازپین

طبقة بندی درمانی : ضد تشنج

طبقة بندی مصرف در حاملگی : گروه D

فراورده های ژنریک ایران

Scored Tablets: 1 mg

Scored Tablets: 2 mg

اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

صرع ابسنس (پتی مال) و ابسنس آتپیک؛ تشنجهای آکینتیک و میوکلونیک

میوکلونوس شبانه

دیس آرتری در پارکینسون

اپی زودهای مانیک حاد

نورالژی

کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

- حساسیت شناخته شده به این دارو و سایر بنزودیازپین ها
- بیماری کبدی شدید
- مزمن ریوی
- گلوکوم زاویه باز درمان نشده
- گلوکوم زاویه باریک
- موارد احتیاط: ○ اختلال عملکرد کلیه.

کلوناسریم

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ در صورت نیاز به قطع دارو، دوز دارو را به صورت تدریجی کاهش دهید.
- ✓ دارو را در ظروف دربسته، مقاوم به نور و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمائید.

آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☐ به بیمار بیاموزید دوز فراموش شده دارو را حداکثر تا یک ساعت پس از زمان مربوطه مصرف نموده در غیر این صورت آن را حذف کند. همچنین از دو برابر کردن دوزهای دارو پرهیز نماید.
- ☐ قطع ناگهانی دارو باعث شروع حملات صرع پایدار، لرزش، تهوع، استفراغ و کرامپ عضلات و شکم می گردد.
- ☐ مصرف این دارو باعث خواب آلودگی و سرگیجه می شود؛ به بیمار توصیه نمائید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ☐ به بیمار توصیه نمائید از مصرف سایر داروهای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی پرهیز نماید.
- ☐ به بیمار بیاموزید در صورت احساس خستگی غیرعادی، خونریزی، گلودرد، تب، تغییر رنگ مدفوع، زردی پوست و تغییرات رفتاری به پزشک مراجعه نماید.

مصرف در دوران شیردهی

در طی درمان با این دارو باید از روش دیگری برای تغذیه شیرخوار استفاده شود.

صرع ابسنس (پتی مال) :	صرع کوچک
میوکلونوس شبانه :	تیک عصبی شبانه
اپی زودهای ماتیک حاد :	حملات ماتیک حاد
نورالژی :	التهاب عصبی
آتیبیک :	غیر نرمال

DIPYRIDAMOLE h

Persantine, Pyridamole

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنالوگ پیریمیدین

• طبقه‌بندی درمانی: گشادکننده عروق کرونری، مهارکننده تجمع پلاکتی

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه C

• فرآورده‌های ژنریک ایران

Coated Tablets: 25 mg

Coated Tablets: 75 mg

Injection: 10 mg/2 ml

• اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

آنژین صدری مزمن

مهار چسبندگی پلاکتها در بیمارانی که از دریچه مصنوعی استفاده می‌کنند، به همراه وارفارین و آسپیرین

پیشگیری از انفارکتوس مجدد میوکارد

• کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط،
موارد احتیاط: ○ هیپوتانسیون ○ مصرف همزمان با داروهای ضدانعقاد.

• تداخلات

دارو - دارو: اثر دارو بر تراکم پلاکتها به دنبال مصرف آسپیرین تشدید می‌گردد.

🔍 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ بهتر است این دارو را با معده خالی (حداقل یکساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا) همراه با یک لیوان آب تجویز نمود. در صورت وجود دیسترس گوارشی می توان دارو را همراه با غذا تجویز کرد.
- ✓ هر 1ml (5mg) دارو باید حداقل با 2ml از D5W و یا D5/NS رقیق شود.
- ✓ از تجویز و مصرف داروی رقیق نشده پرهیز نمائید.
- ✓ دارو را باید در ظروف دربسته و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمود.

پیگیری و بررسی تأثیر دارو:

- ✓ پاسخ بالینی حداقل دو تا سه ماه بعد از شروع درمان ایجاد خواهد شد.
- ✓ پاسخ درمانی بصورت کاهش حملات آنژین صدری، افزایش تحمل فعالیت و کاهش نیاز به نیتراتها ارزیابی می شود.

🔍 آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☑ به بیمار بیاموزید دارو را کاملاً مطابق دستور با همان فواصل تجویز شده مصرف نماید در صورتی که دوز فراموش شده را تا 4 ساعت مانده به نوبت بعدی پیادآورد، آن را مصرف نماید، در غیر اینصورت دوز مذکور را حذف نموده و از دو برابر کردن دوزهای بعدی نیز پرهیز نماید.
- ☑ به بیمار توصیه نمائید به منظور پیشگیری از بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک به آرامی تغییر وضعیت دهد.
- ☑ به بیمار بیاموزید در صورت بروز خونریزی یا خون مردگی غیر معمول به پزشک اطلاع دهد.

🔍 مصرف در دوران شیردهی

عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده است، با این حال منافع دارو در برابر ضررهای احتمالی آن باید سنجیده شود.

DIAZEPAM h

E.Pam, Diapam, Diazepam-CD, Meval, N-Calme, Novodipam, Rival, Tranquine, Valium, Valrelease, Vivol, Zepadac

طبقه بندی فارماکولوژیک : بنزودیازپین

طبقه بندی درمانی : ضداضطراب، شل کننده عضلات اسکلتی، ضد تشنج، آرام بخش - خواب آور

طبقه بندی مصرف در حاملگی : گروه D

❁ فرآورده های ژنریک ایران

Tablets: 2 mg

Tablets: 5 mg

Tablets: 10 mg

Syrup: 2 mg/5 ml

Suppositories: 5 mg

Suppositories: 10 mg

Injection: 10 mg/2 ml

Rectal Tube: 5 mg

Rectal Tube: 10 mg

❁ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

اضطراب و Tension

سندرم قطع مصرف حاد الک

درمان کمکی در اسپاسم عضلات اسکلتی

درمان کمکی در اختلالات همراه با تشنج

درمان کمکی در بیهوشی و اقدامات آندوسکوپی

استاتوس اپی لپتیکوس

کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

درمان

کنتراندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط ● گلوکوم حاد زاویه باریک و یا گلوکوم زاویه باز درمان نشده ● شوک کوم
● مسمومیت حاد با الکل ● کودکان با سن کمتر از ۳۰ روز.
موارد احتیاط: ○ سایکوز ○ میاستنی گراو ○ بیماری پارکینسون ○ اختلال عملکرد کلیه و کبد ○ بیماران مس ناتوان.

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ از قطع ناگهانی مصرف دارو خودداری نمایید.
- ✓ دارو را در ظروف مقاوم به نور و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمایید.
- پیگیری و بررسی تأثیر دارو:
 - ✓ اکثر عوارض جانبی دارو وابسته به دوز هستند.
 - ✓ حداکثر تأثیر درمانی دارو ۱-۲ هفته بعد از شروع مصرف آن رخ می دهد.
 - ✓ در خلال تزریق وریدی علائم حیاتی بیمار را بدقت کنترل نمایید.
 - ✓ عوارض جانبی اغلب در افراد مسن و ناتوان شدیدتر است.
 - ✓ میزان I&O بیمار را کنترل نمایید.
 - ✓ سیگار کشیدن متابولیسم دیازپام را تسریع و اثرات درمانی آن را تضعیف می نماید. افراد سیگاری نیاز به دوزهای بالاتری از دارو دارند.

آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☒ به بیمار بیاموزید دارو را درست مطابق دستور پزشک بکار برد و از افزایش یا کاهش دوز دارو بدور دستور پزشک پرهیز نماید. قطع ناگهانی دارو باعث بی خوابی، تحریک پذیری یا عصبانیت غیرمعمول و تشنج می گردد.
- ☒ مصرف این دارو باعث خواب آلودگی، ناهنجاریهای رفتاری، بی ثباتی و ناهماهنگی در راه رفتن می گردد. بنابراین به بیمار توصیه کنید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ☒ به بیمار تذکر دهید از مصرف داروهای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی پرهیز نماید.
- ☒ به بیمار گوشزد نمایید در صورت شک یا تصمیم به بارداری به پزشک اطلاع دهد.

مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر مادر ترشح می شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

استاتوس اپی لپتیکوس : صرع پایدار یا مداوم

DIMENHYDRINATE h

Apo-Dimenhydrinate, Calm X, Dimentabs, Dinat, Dommanate, Dramamine, Dramilin, Dramocen, Dramoject, Dymenate, Gravol, Hydrate, Marmine, Motion-Aid, Nauseatol, Novodiminate, PMS-Dimenhydrinate, Reidamine, Travamine, Travelin, Wehamine

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنتاگونیست گیرنده H_1

طبقه‌بندی درمانی: آنتی‌هیستامین، ضد استفراغ و ضد سرگیجه

طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه B

فراورده‌های ژنریک ایران

Scored Tablets: 50 mg

اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

پیشگیری و درمان تهوع، استفراغ و سرگیجه در بیماری حرکت (motion sickness)

بیماری منییر (meniere's)

کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط نسبت به این دارو و سایر داروهای آنتی‌هیستامینی ضد استفراغ با ساختمان شیمیایی مشابه (مانند دیفن‌هیدرامین) و بیمارانی که به تتوفیلین حساسیت دارند.

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ جهت پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از رادیاسیون، دارو را باید یک ساعت قبل از درمان و سپس ۱ و ۳ ساعت بعد از درمان تجویز نمود.

✓ دارو را در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری کنید.

آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ این دارو باعث خواب‌آلودگی و سستی می‌گردد، به همین جهت به بیمار توصیه نمائید تا مشخص

نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☒ به بیمار تذکر دهید در طی درمان از مصرف داروهای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی پرهیز نماید.

مصرف در دوران شیردهی

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

ERGOTAMINE-C h

Cafatine Tablets, Cafergot Tabs, Cafetrate Tablets, Ercaf Tablets, Ercatab, Ergo Caff Tablets, Migrovin, Wigraine Tablets

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ترکیب آکالوئید ارگوت و کافئین

• طبقه‌بندی درمانی: تنگ‌کننده عروق

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه X

❖ فرآورده‌های ژنریک ایران

Coated Tablets:

Ergotamine Tartrate 1 mg and

Caffeine 100 mg

❖ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

جلوگیری و درمان سردردهای عروقی، شامل میگرن و سردردهای کلاستر

بالغین: با ایجاد اولین علامت شروع سردرد، دو قرص مصرف می‌شود و سپس در صورت نیاز هر ۳۰ دقیقه یک قرص دیگر مصرف می‌شود. حداکثر دوزاژ در هر حمله ۶ قرص است. نباید بیش از ۱۰ قرص در هفته مصرف شود.

❖ کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● Sepsis ● بیماری عروق محیطی ● اختلال عملکرد کبد یا کلیه ● سوءتغذیه ● حساسیت مفرط نسبت به این دارو یا آکالوئیدهای ارگو ● زنانی که قصد حاملگی دارند.

❖ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمایید.

❖ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☐ به بیمار پیاموزید به محض بروز اولین علامت دال بر شروع سردرد دارو را مصرف نموده و افزایش حداکثر دوز تجویز شده پرهیز نماید.

☐ به بیمار توصیه نمائید پس از مصرف دارو برای مدتی در یک اتاق ساکت و تاریک استراحت نماید.

☐ علایم سمیت دارویی را برای بیمار توضیح داده و توصیه نمائید در صورت بروز هریک از آنها سریعاً پزشک را مطلع سازد.

☐ به بیمار توصیه نمائید در طی درمان با این دارو از مصرف سیگار و قرارگرفتن در هوای سرد خودداری نماید، چون هر دوی این موارد باعث انقباض عروقی شده و بدین ترتیب اختلال گردش خون محیطی تشدید می‌گردد.

❖ مصرف در دوران شیردهی

ENALAPRIL Mateate h

Enaprel, Vasotec

طبقة بندی فارماکولوژیک : مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACE)

طبقة بندی درمانی : ضد هیپرتانسیون

طبقة بندی مصرف در حاملگی : گروه C (در سه ماهه دوم و سوم حاملگی: گروه D)

فرآورده های ژنریک ایران

Scored Tablets: 5 mg

Scored Tablets: 20 mg

اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

هیپرتانسیون خفیف تا شدید؛ نارسایی قلب

کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: حساسیت مفرط.

موارد احتیاط: بیماریهای کلاژن واسکولار ○ بیماریهای سیستم ایمنی ○ اختلال عملکرد کلیه.

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ به منظور پیشگیری از بروز هیپوتانسیون، در صورت امکان ۲-۳ روز قبل از شروع دارو، مصرف دیورتیکها را قطع نمائید.
- ✓ در صورت عدم امکان این کار دارو را با دوز ۲.۵mg شروع نمائید.
- ✓ دارو را می توان همراه با غذا یا مایعات مصرف نمود.
- ✓ دارو را دور از حرارت و نور و درجه حرارت کمتر از 30°C نگهداری نمائید.

آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☒ به بیمار بیاموزید علیرغم احساس بهبودی دارو را کاملاً مطابق دستور بکار برده و دوز فراموش شد را بلافاصله پس از بخاطر آوردن مصرف کند، مگر اینکه فرصتی تا زمان مصرف دوز بعدی وجود نداشته باشد. همچنین از دو برابر نمودن دوزهای دارو پرهیز نماید.
- ☒ به بیمار تذکر دهید از مصرف جانشین شونده های نمک یا غذاهای حاوی سدیم یا پتاسیم بدون مشورت با پزشک خودداری نماید.
- ☒ به بیمار توضیح دهید که مصرف این دارو ممکن است باعث اختلال چشایی گردد که معمولاً علیرغم ادامه درمان بطور خود بخود ظرف ۸-۱۲ هفته برطرف می گردد.
- ☒ به بیمار توضیح دهید جهت پیشگیری از هیپوتانسیون ارتوستاتیک، خصوصاً پس از مصرف اولین دوز دارو، از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نماید. همچنین تذکر دهید انجام تمرینات بدنی یا قرار گرفتن در آب و هوای گرم باعث تشدید اثرات هیپوتانسیو دارو می گردد.
- ☒ مصرف این دارو باعث سرگیجه می شود، به همین جهت به بیمار توصیه نمائید تشخیص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ☒ به بیمار بیاموزید در صورت بروز راش، خشکی دهان، گلودرد، تب، تورم دستها یا پاها، بی نظمی ضربانات قلب، درد قفسه سینه، سرفه های خشک، تورم صورت، چشمها، لبها و زبان، اشکال در تنفس به پزشک اطلاع دهد.

مصرف در دوران شیردهی

FLUOXETINE (as HCl) h

Fluoxetin-PD, Lorazac, Oxetine, Prozac

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مهارکننده جذب سروتونین

• طبقه‌بندی درمانی : ضدافسردگی

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه B

• فرآورده‌های ژنریک ایران

Capsules: 10 mg

Capsules: 20 mg

Syrup: 20 mg/5 ml

• اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

افسردگی، اختلال دو قطبی، وابستگی به الکل، کاتاپلکسی، میوکلونوس
اختلال وسواسی - اجباری

• کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط.
موارد احتیاط: ○ اختلال شدید عملکرد کلیه یا کبد ○ تشنج ○ دیابت.

• توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:
✓ در بیماران با سابقه خودکشی و یا احتمال خودکشی، دارو را در مقادیر کم در اختیار بیمار قرار دهید.

• آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☒ به بیمار توصیه نمائید دارو را مطابق دستور مصرف نماید و در صورت فراموش نمودن مصرف یک نوبت دارو به محض بیدار آوردن آن را مصرف نماید و از دوبرابر کردن دوز دارو پرهیز کند.
- ☒ به بیمار پیاموزید تا مشخص نشدن اثرات دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز کند.
- ☒ به بیمار توصیه نمائید در صورت بروز سردرد، تهوع، بی‌اشتهایی، اضطراب و یا بی‌خوابی پایدار به پزشک مراجعه نماید.
- ☒ به بیمار توصیه نمائید در صورت شک یا تصمیم به بارداری به پزشک خود اطلاع دهد.

• مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط کامل صورت گیرد.

حملات ناگهانی و موقت از دست رفتن
کاتاپلکسی:

تونوس عضلات و یا قیچ در طی روز

میوکلونوس: انقباض ناگهانی و مدهن نظم عضلات

FURAZOLIDONE h

Furaben, Furoxone

طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مشتقات نیتروفوران

طبقه‌بندی درمانی : ضدباکتری و ضدتک‌یاخته

طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 100 mg

Suspension: 50 mg/15 ml

اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

گاستروآنتریت؛ درمان کمکی در کلرا

کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● شیرخواران کوچکتر از یک ماه ● حساسیت مفرط.
موارد احتیاط: ○ کمبود آنزیم گلوکز ۶ - فسفات دهیدروژناز (G6PD).

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور نگهداری نمائید.

آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار توصیه نمائید از مصرف غذاهای حاوی تیرامین (پنیر، باقلا، شکلات، مخمر آب‌جو و غیره) خودداری نماید.

☒ به بیمار گوشزد نمائید مصرف این دارو ممکن است رنگ ادرار را قهوه‌ای نماید.

☒ به بیمار توصیه نمائید در صورت بروز سردرد، تهوع و استفراغ به پزشک مراجعه نماید.

مصرف در دوران شیردهی

بی‌ضرر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است.

کلرا : ویا

GEMFIBRAZIL h

Lopid, Gemfibrazil-PD

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مشتقات اسید فیبریک

• طبقه‌بندی درمانی : کاهش‌دهنده چربی خون

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

• فرآورده‌های ژنریک ایران

Coated Tablets: 450 mg

Capsules: 300 mg

• اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

تیپ IV هیپرتری گلیسیریدمی و هیپرکلسترولمی‌های شدید که به رژیم غذایی و سایر داروها پاسخ نمی‌دهند.

• کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیونها: • حساسیت مفرط • بیماریهای کیسه صفرا • اختلال عملکرد کبد (نظیر سیروز اولیه صفراو • نارسایی شدید کلیه.

• توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو: ✓ دارو را در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمایید.

• آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☐ به بیمار بیاموزید دارو را کاملاً مطابق دستور مصرف نموده و به واسطه فراموش نمودن یک دوز حذف یا دو برابر نمودن دوزهای بعدی پرهیز نماید. اگر یک نوبت از دارو فراموش شد، باید بلافاصله پس از بخاطر آوردن مصرف نماید، مگر اینکه تقریباً زمانی تا موعد دوز بعدی باقی نمانده باشد. ☐ مصرف این دارو باید با رعایت محدودیتهای غذایی (چربی، کلسترول، کربوهیدرات)، انجام تمرینات بدنی و قطع مصرف سیگار همراه شود. ☐ به بیمار بیاموزید در صورت بروز هر یک از علائم زیر سریعاً به پزشک اطلاع دهد: دردهای شدید معدی همراه با تهوع و استفراغ، تب، لرز، گلودرد، همچنین در صورتی که دچار اسهال، راش پوستی، کرامپ عضلانی، ناراحتی منتشر شکمی یا نفخ مقاوم و درمان‌ناپذیر شد نیز باید به پزشک اطلاع دهد.

• مصرف در دوران شیردهی

بی‌ضرر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است.

هیپرتری گلیسیریدمی : تری گلیسیرید بالا

هیپر کلسترولمی : کلسترول بالا

IMIPRAMINE HCl h

Janimine, Lofranil, SK-Pramine, Tofranil, Typramine

طبقة بندی فارماکولوژیک : ضد افسردگی سه حلقه ای (دی بنزازپین).

طبقة بندی درمانی : ضد افسردگی

طبقة بندی مصرف در حاملگی : گروه D

فرآورده های ژنریک ایران

Coated Tablets: 10 mg

Coated Tablets: 25 mg

Coated Tablets: 50 mg

Injection: 25 mg/2 ml

اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

افسردگی؛ اضطراب؛ درد نوروژنیک

شب ادراری در کودکان

کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیونها: حساسیت مفرط به ضد افسردگیهای سه حلقه ای • در مرحله بهبودی بعد از MI • بیماران مبتلا به کوما و دپرسیون شدید تنفسی.

موارد احتیاط: بیماریهای قلبی (دیس ریتمی ها، CHF، آنژین صدری، بیماریهای دریچه قلب، طولانی شدن زمه موج QRS، بلوک قلبی) • تیپ I و II دیابت • هیپرتروفی پروستات • ایلئوس پارالیتیک • اختلال عملکرد کلیه

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ بهتر است دارو را همراه و یا بلافاصله بعد از غذا تجویز نمایید.
- ✓ در صورت وجود کریستال در داخل آمپول تزریقی ایمی پرامین، می توانید آن را بمدت یک دقیقه در داخل آب گرم قرار دهید تا کریستال ها حل شوند.
- ✓ دارو را باید در درجه حرارت ۱۵-۳۰°C نگهداری کرد.

آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار بیاآموزید دارو را کاملاً مطابق با دستور مصرف نموده و از حذف یا دو برابر نمودن دوزها؛ دارو به سبب فراموش نمودن یک نوبت آن پرهیز نماید. همچنین به بیمار توصیه نمایید جهت بروز اثرات دارو حداقل ۲ هفته درمان مداوم ضروری است. قطع ناگهانی درمان، سبب بروز تهوع، سردرد و حالت ضعف و بی قراری می گردد.

مصرف این دارو باعث ایجاد حالت خواب‌آلودگی و تاری دید می‌گردد. به همین جهت به بیمار توصیه نمائید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز کند.

☒ به بیمار بیاموزید بروز تغییرات بینایی را به پزشک گزارش نماید. در درمانهای درازمدت باید بیمار طبق دستور پزشک تحت معاینات دوره‌ای از نظر ابتلا به گلوکوم قرار گیرد.

☒ به بیمار توصیه کنید جهت پیشگیری از بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک به آرامی تغییر وضعیت دهد.

☒ به بیمار توصیه نمائید درطی درمان با این دارو و حداقل ۲-۳ روز پس از قطع درمان از مصرف داروهای تضعف سیستم اعصاب مرکزی پرهیز نماید.

☒ به بیمار بیاموزید درصورت بروز احتباس ادرار یا انجام حرکات غیرقابل کنترل یا خشکی دهان و یبوست مقاوم به پزشک اطلاع دهد. مصرف آب‌نبات‌ها یا آدامس‌های کم شیرینی در کاهش خشکی دهان و افزایش میزان مایعات یا غذاهای حجیم در رژیم غذایی بیمار در پیشگیری از بروز یبوست مؤثر می‌باشد.

☒ برای بیمار ضرورت کنترل مقدار غذای مصرفی‌اش را شرح داده و توصیه نمائید افزایش اشتهای ناشی از مصرف این دارو ممکن است سبب افزایش وزن نامطلوبی گردد.

اطفال: ☒ به والدین بیمار توضیح دهید که اثرات جانبی که معمولاً در اطفال بروز می‌نماید شامل عصبانیت بی‌خوابی، خستگی غیرطبیعی، تهوع و استفراغ خفیف است که درصورت بروز باید به پزشک اطلاع داده شود.

🕒 مصرف در دوران شیردهی

این دارو با غلظت‌های کم در شیر ترشح می‌شود. منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.

دیس ریتمی : نا منظم

درد نوروزنیک : درد با منشأ درگیری عصبی

LEVOTHYROXINE Sodium h

Levothyroid, Levoxine, Synthroid, Synthrox, Syroxine

طبقه‌بندی فارماکولوژیک : هورمون تیروئید (T_4)

طبقه‌بندی درمانی : جایگزین هورمون تیروئید

طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه A

❖ فرآورده‌های ژنریک ایران

Scored Tablets: 50 mcg

Tablets: 100 mcg

❖ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

کرتینیسم

جایگزین هورمون تیروئید

❖ کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● تیروتوکسیکوز ● انفارکتوس حاد میوکارد ● درمان جاقی.
موارد احتیاط: ○ آنزین و سایر بیماری‌های قلبی - عروقی ○ دیابت ملیتوس ○ سوءجذب ○ هیپوتیروئیدی
طول کشیده و میکزدم.

❖ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ جهت پیشگیری از بروز بی‌خوابی بهتر است دارو را بصورت دوز منفرد و قبل از صبحانه تجویز کرد.
- ✓ میزان دوز نگهدارنده در افراد مسن معمولاً ۲۵٪ کمتر از دوز بالغین جوان است.
- ✓ دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمائید.

آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار بیاموزید دارو را درست مطابق دستور روزانه و در زمان معینی مصرف نماید و اگر نوبتی دارو را فراموش نمود، به محض به‌خاطر آوردن آن را مصرف نماید مگر اینکه فرصتی تا زمان مصرف نوبت بعدی وجود نداشته باشد و اگر بیش از ۳-۲ نوبت دارو فراموش شد باید به پزشک اطلاع داده و از قطع ناگهانی دارو نیز پرهیز نماید.

☒ به بیمار و خانواده‌اش تکنیک صحیح کنترل نبض را آموزش داده و تأکید کنید در صورت وجود نبض زیر ۱۰۰ ضربه در دقیقه دارو را قطع نموده و به پزشک اطلاع دهند.

☒ به بیمار توصیه کنید در صورت بروز علائمی چون سردرد، عصبانیت و اسهال، تعریق شدید، عدم تحمل گرما، درد قفسه سینه، افزایش تعداد نبض، طپش قلب و کاهش وزن و یا هر علامت غیرمعمول دیگر به پزشک اطلاع دهد.

☒ به بیمار گوشزد کنید بدون دستور پزشک از هیچ داروی دیگری بطور همزمان با لووتیروکسین استفاده نکند.

با والدین کودک در مورد ضرورت انجام آزمونهای پیگیر روتین در جهت اطمینان از تکامل نورما کودکشان صحبت نمائید. همچنین به آنها توضیح دهید که ریزش موی کودک طبیعی و معمولاً موقتی است.

مصرف در دوران شیردهی

مقادیر ناچیزی از این دارو در شیر ترشح می‌شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.

تایید توکسیکوز : آلودگی به توکسیدوز

METOCLOPRAMIDE HCl h

Clopra, Demetic, Emetamid, Mexolone, Pladic, Plasil, Plazilin, Reclomide, Reglan

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مشتقات پارآمینوبنزوئیک اسید (PABA)

• طبقه‌بندی درمانی : ضد استفراغ، محرک دستگاه گوارش

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه B

• فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: Metoclopramide 10 mg

Oral Drops: Metoclopramide 60 mg/15 ml

Injection: Metoclopramide 10 mg/2 ml

• اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

جلوگیری و کاهش تهوع و استفراغ ناشی از سیس‌پلاتین و سایر ترکیبات شیمی‌درمانی

طولانی‌شدن تخلیه معده ثانویه به گاستروپارزی دیابتیک

تسهیل انتوباسیون روده باریک و مطالعات رادیولوژیک

✖ استفراغ

ریفلاکس گاستروازوفازیال

• کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: • سابقه واکنش افزایش حساسیت به این دارو یا سولفونامیدها • فنوکروموسیتوم • اختلال همراه با تشنج • نارسایی کلیه یا کبد • بیماری پارکینسون • خونریزی‌های دستگاه گوارش • انسداد یا پارگی روده.

موارد احتیاط: ○ کودکان ○ سابقه سرطان پستان.

• توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را ۳۰ دقیقه قبل از غذا و هنگام خواب تجویز ننمائید.

✓ جهت تجویز وریدی مقادیر بیش از ۱۰ mg، دارو را باید در محلول‌های تزریقی رقیق و در خلال ۱۵ دقیقه انفوزیون کرد.

✓ در خلال انفوزیون وریدی، محلول حاوی متوکلوپرامید را باید در مقابل نور محافظت کرد.

✓ دارو را در ظروف مقاوم به نور و درجه حرارت ۱۵-۳۰°C نگهداری ننمائید.

پیگیری و بررسی تأثیر دارو:

✓ علائم اکسترایرامیدال اغلب در کودکان، نوجوانان و افراد مسن دیده می‌شوند.

✓ تأثیر دارو در گاستروپارزی دیابتیک بصورت بهبود بی‌اشتهایی، تهوع، استفراغ و احساس پری مداوم معده دیده می‌شود.

✓ بیمار را از نظر بروز هیپرناترمی و هیپوکالمی تحت نظر بگیرید.

افزایش پرولاکتین سرم ناشی از مصرف دارو، اغلب ظرف چند هفته تا چند ماه اصلاح خواهد شد.

آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار بیاموزید دارو را کاملاً مطابق با دستور مصرف نموده و در صورت فراموش نمودن یک نوبه به محض به خاطر آوردن آن را مصرف نماید. مگر اینکه تقریباً فرصتی تا زمان مصرف دوز بعدی وجود نداشته باشد.

☒ مصرف این دارو باعث خواب‌آلودگی خواهد شد. به بیمار توصیه کنید تا مشخص نشدن تأثیر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☒ به بیمار توصیه کنید از مصرف همزمان داروهای تضعیف‌کننده سیستم اعصاب مرکزی در طی درمان با این دارو پرهیز نماید.

☒ به بیمار توصیه نمائید در صورت ایجاد حرکات غیرارادی در چشم‌ها، صورت یا اندام‌ها فوراً به پزشک اطلاع دهد.

مصرف در دوران شیردهی

عوارضی برای آن در انسان گزارش نشده است؛ با این حال منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.

ریفلاکس گاستروازوفلایال : برگشت محتویات معده به مری

METHOCARBAMOL h

Delaxin, Robamol, Robaxin, Relaximol, Robaxole

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مشتق کربنات گواپنیزین

• طبقه‌بندی درمانی : شل‌کننده عضلات اسکلتی

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

• فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 500 mg

Injection Solution: 1000 mg/10 ml

• اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

درمان کمکی در دردهای حاد عضلانی - استخوانی

درمان حمایتی در کنترل تظاهرات عصبی - عضلانی کزاز

• کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: • سابقه واکنش افزایش حساسیت.
موارد احتیاط: ○ سابقه اپی‌لپسی ○ اختلال عملکرد کلیه.

• توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ در صورت تجویز دارو بوسیله تزریق عضلانی نباید بیش از 5ml (500 mg) از دارو را در هر طرف از عضله گلوئتال تزریق نمود. دارو را باید بصورت عمیق و به آهستگی تزریق نمود.
- ✓ دارو را در درجه حرارت ۱۵-۳۰°C نگهداری نمایید.

• آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار بیاموزید دارو را مطابق تجویز بکار برده و نوبت فراموش شده را تا یک ساعت پس از زمان اصلی مصرف نماید. در غیر این صورت از مصرف آن خودداری نموده و درمان را طبق برنامه معمول ادامه دهد. همچنین از دو برابر نمودن دوزهای دارو پرهیز نماید.

☒ بیمار را به کاربرد سایر شیوه‌های موجود جهت رفع اسپاسم عضلات (گرما، استراحت و فیزیوتراپی) تشویق نماید.
☒ مصرف دارو باعث سرگیجه، خواب‌آلودگی و تاری دید می‌گردد. به بیمار توصیه کنید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☒ به بیمار بیاموزید جهت کاهش احتمال بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک به آهستگی تغییر وضعیت دهد.
☒ به بیمار تأکید کنید از مصرف مواد تضعیف‌کننده سیستم اعصاب مرکزی در طی درمان با این دارو پرهیز نماید.
☒ به بیمار توضیح دهید که رنگ ادرارش سیاه، قهوه‌ای یا سبز خواهد شد؛ خصوصاً اگر برای مدتی در مجاورت هوا باقی بماند.

☒ به بیمار بیاموزید در صورت بروز راش، خارش، تب یا احتقان بینی به پزشک اطلاع دهد.

• مصرف در دوران شیردهی

این دارو با غلظت کم در شیر ترشح می‌شود. با این حال تغذیه با شیر مادر در حین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

MEBENDAZOLE h

Benazole, Vermox

طبقه‌بندی فارماکولوژیک : کاربامات

طبقه‌بندی درمانی : ضدکرم

طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

فرآورده‌های ژنریک ایران

Chewable Tablets: 100 mg

اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوز

اسکاریدوز؛ تریکوریدوز؛ آلودگی به کرم‌های قلابدار
اکسیوروز

کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● سابقه واکنش افزایش حساسیت.
موارد احتیاط: ○ اختلال عملکرد کبد ○ بیماری کرون ○ کولیت اولسراتیو ○ کودکان زیر ۲ سال.

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:
✓ قرص را می‌توان جوید، خرد کرد، با مایعات مخلوط و یا بصورت کامل بلع نمود.

آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار بیاموزید دارو را کاملاً مطابق با دستور مصرف نموده و علیرغم احساس بهبودی دور درمانی را به پایان برساند. در صورتی که برنامه مصرف دارو به صورت ۲ نوبت در روز بود و یک نوبت فراموش شد یا باید آن را حداقل تا ۵-۴ ساعت مانده به نوبت بعدی مصرف نماید و یا از مصرف آن صرف‌نظر نموده و نوبت بعدی را دو برابر کند.

☒ جهت پیشگیری از عفونت مجدد، آموزش جنبه‌های بهداشتی (شستن دست‌ها با صابون قبل از غذا و بعد از اجابت مزاج، ضدعفونی کردن روزانه توالت، خودداری از تماس دست‌ها با دهان، شستشوی تمامی میوه‌ها و سبزیجات، پوشیدن کفش) ضروری است.

☒ چون مصرف دارو احتمالاً سبب سرگیجه خواهد شد به بیمار توصیه نمائید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☒ به بیمار توصیه نمائید در صورت عدم بهبودی تا چند روز پس از درمان، به پزشک اطلاع دهد.

کرمک: ☒ به بیمار بیاموزید جهت پیشگیری از عفونت مجدد از تکاندن ملحفه و رختخواب‌ها پرهیز نموده و تمهیدات وسایل خواب، لباس زیر و حوله‌ها را پس از درمان بشوید.

مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر مشخص نیست و عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.

تریکوریدوز: آلودگی به تریکوموناس

NAPHAZOLINE HCl or Nitrate h

AK-Con, Albalon Liquifilm, Allerest, Clear Eyes, Comfort Eye Drops, Degest
Z, I-Naphline, Naphcon A, Naphcon Forte, Napravin, Provine Hydrochloride,
Vasoclear, Vasocon

طَبَقه‌بندی فارماکولوژیک : سمپاتومیمتیک

طَبَقه‌بندی درمانی : ضداحتقان، تنگ‌کننده عروق

طَبَقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

فرآورده‌های ژنریک ایران

Nasal Drops: 0.05%

Sterile Eye Drops: 0.1%

اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوز

احتقان چشم؛ تحریک و خارش چشم

احتقان بینی

کنترل اندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط ● گلوکوم زاویه باریک،
موارد احتیاط: ○ هیپرتیروئیدیسم ○ بیماری‌های قلبی ○ فشارخون ○ دیابت ملیتوس ○ بیماران مسن .

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را در ظروف دربسته و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمائید.

آموزش بیمار / خانواده

چشمی: ☒ به بیمار تکنیک صحیح کاربرد قطره‌های چشمی را بیاموزید. دست‌ها را بشوئید، بیمار را بخوابانید یا سرش را به سمت عقب خم کنید و از او بخواهید به سقف نگاه کند. پلک تحتانی‌اش را به سمت پایین کشیده و قطره را در فضای ایجاد شده بریزید. جهت اطمینان از تأثیر موضعی دارو تا ۲-۱ دقیقه پس از چکاندن قطره، گوشه داخلی چشم را بفشارید. قبل از چکاندن قطره بعدی ۵ دقیقه تأمل کنید. از تماس نوک یا سرپوش قطره‌چکان، انگشتان یا هر سطح دیگری با چشم بیمار جلوگیری نمائید.

بینی: ☒ بر ضرورت کاربرد دارو مطابق تجویز تأکید نموده و توصیه نمائید که کاربرد طولی‌المدت دارو باعث احتقان برگشتی بینی خواهد شد.

مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر ثابت نشده و عوارضی نیز برای انسان گزارش نشده است. با این وجود بدلیل جذب سیستمیک، منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.

NAPHAZOLINE - ANTAZOLINE h

Anaprivin

طبقه بندی فارماکولوژیک : ترکیب سمپاتومیمتیک و آنتی هیستامین

طبقه بندی درمانی : ضداحتقان و آنتی هیستامین

طبقه بندی مصرف در حاملگی : گروه C

فراآورده های ژنریک ایران

Sterile Eye Drops:

Naphazoline HCl 0.05% and

Antazoline Phosphate 0.5%

اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

تخفیف تحریک یا احتقان چشم؛ درمان حملات آلرژی، التهاب یا عفونت چشم

بالغین: یک یا دو قطره بر روی ملتحمه چکانده می شود. در صورت نیاز هر ۳ تا ۴ ساعت این دوز تکرار می شود. جهت اطلاعات بیشتر به داروی Naphazoline HCl مراجعه نمایید.

OXAZEPAM h

Sedarin, Serax, Serepax

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک: بنزودیازپین

• طبقه‌بندی درمانی: ضد اضطراب، آرام‌بخش - خواب‌آور

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه D

❖ فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 10 mg

❖ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

اضطراب شدید

اضطراب خفیف تا متوسط: Tension

❖ کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط ● گلوکوم حاد زاویه باریک ● گلوکوم زاویه باز درمان نشده ● کوما ● مسمومیت حاد با الکل.

موارد احتیاط: ○ سایکوز ○ میاستنی گراو ○ بیماران پارکینسون ○ اختلال عملکرد کلیه و کبد ○ بیماران مسن و ناتوان ○ احتمال اعتیاد به دارو.

❖ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ در صورت بروز علائم گوارشی، می‌توان اکسازپام را همراه با غذا تجویز نمود.

✓ دارو را در ظروف دربسته و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری کنید.

❖ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار بیاموزید دارو را مطابق تجویز بکار برده و دوز فراموش شده را ظرف یک ساعت بعد مصرف نماید. در صورتی که دیرتر بخاطر آورد از مصرف آن خودداری نموده و برنامه معمول را ادامه دهد. از دو برابر نمودن یا افزایش دوز دارو پرهیز نماید. اگر پس از یک هفته مصرف، تغییر اندکی در وضعیت سلامتش پدید آمد به پزشک اطلاع دهد.

☒ مصرف این دارو ممکن است باعث خواب‌آلودگی یا سرگیجه گردد، به بیمار توصیه کنید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☒ به بیمار توصیه کنید در صورت شک یا تصمیم به بارداری با پزشک مشورت نماید.

❖ مصرف در دوران شیردهی

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

PHENAZOPYRIDINE HCl h

Azo-Standard, Baridium, Di-Azo, Diridone, Phenazo, Phenazodine, Pyridiate, Pyridium, Pyronium, Urodine

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : رنگ آزو

• طبقه‌بندی درمانی : ضددرد مجاری ادراری

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه B

• فرآورده‌های ژنریک ایران

Film Coated Tablets: 100 mg

• اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

درد همراه با تحریک یا عفونت مجاری ادراری

• کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: • حساسیت مفرط • نارسایی کلیوی و کبدی.

• توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ فنازوپیریدین را باید بعد از غذا تجویز نمود.

پیگیری و بررسی تأثیر دارو:

✓ در صورت مصرف درازمدت دارو باید آزمایشات بررسی عملکرد کلیه را در فواصل منظم درخواست نمود.

• آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار توصیه کنید دارو را درست مطابق تجویز بکاربرده و در صورت فراموش شدن یک دوز بلافاصله پس از بیدار شدن آن را مصرف نماید مگر اینکه تقریباً فرصتی تا زمان مصرف دوز بعدی وجود نداشته باشد.

☒ به بیمار توضیح دهید که مصرف دارو باعث تغییر رنگ ادرار به پرتقالی روشن می‌گردد که ممکن است باعث رنگی شدن لباس یا رختخواب شود. بهتر است برای پیشگیری از این مشکل از نوارهای بهداشتی استفاده نماید.

☒ به بیمار بیاموزید در صورت بروز راش، تغییر رنگ پوست یا خشکی غیر معمول به پزشک اطلاع دهد.

• مصرف در دوران شیردهی

بی‌ضرر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

PROPRANOLOL HCl

Avlocardyl, Inderal, Pranol, Procardin, Proprated

طبقة‌بندی فارماکولوژیک : مسدودکننده گیرنده بتا - آدرنژیک

طبقة‌بندی درمانی : ضد‌هیپرتانسیون، ضد‌آنژین، درمان کمکی در میگرن، درمان کمکی در انفارکتوس میوکارد (M.I.)

طبقة‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C (در سه ماهه دوم و سوم بارداری: گروه D)

فرآورده‌های ژنریک ایران

Film Coated Tablets: 10 mg

Film Coated Tablets: 20 mg

Scored Film Coated Tablets: 40 mg

Scored Film Coated Tablets: 80 mg

Sustained Release Tablets: 80 mg

Sustained Release Tablets: 160 mg

Injection Solution: 1 mg/ml

اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

هیپرتانسیون

آنژین صدری

جلوگیری از سردردهای عروقی یا میگرن کنترل‌نشده شدید و مکرر

کاهش مرگ و میر بعد از انفارکتوس میوکارد

درمان کمکی اضطراب

درمان ترمورهای اولیه (Essential)، فامیلیال و سنی

درمان کمکی در تیروتوکسیکوز

دیس‌ریتمی‌های فوق‌بطنی، بطنی و دهلیزی؛ تاکی‌دیس‌ریتمی‌های ناشی از آزادشدن بیش از حد کاکتول‌آمین‌ها در حین بیهوشی، هیپرتیروئیدی و فئوکروموسیتوم

کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: حساسیت مفرط • نارسایی قلبی • تاکیکاردی سینوسی • بلوک دهلیزی - بطنی درجه ۲ • شوک کاردیوژنیک • سندرم رینود.

موارد احتیاط: • نارسایی عروق کرونری • نارسایی احتقانی قلب • بیماری‌های ریوی • دیابت ملیتوس • هیپوگلیسمی • هیپرتیروئیدسم • اختلال عملکرد کبد.

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ بهتر است ترکیبات خوراکی دارو قبل از غذا و قبل از خواب تجویز شوند. بهر حال به بیمار یادآوری نمائید جهت به حداقل رسانیدن تغییر در جذب دارو، همیشه دارو را به یک صورت (با معده خالی یا همراه با غذا) مصرف نماید.
- ✓ هر 1 mg را می توان با 10 ml از D5W یا نرمال سالین رقیق کرد.
- ✓ قرص را می توان خرد و همراه با مایعات تجویز نمود.
- ✓ در صورت تصمیم به قطع دارو، دوزاژ را بتدریج و در خلال 1-2 هفته قطع کنید و در این مدت بیمار را دقیقاً تحت نظر بگیرید.
- ✓ دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری کنید.

آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی:** ☑ به بیمار بیاموزید دارو را درست مطابق دستور بکار برده و در صورت فراموش نمودن یک دوز حداکثر تا 8 ساعت مانده به دوز بعدی باید آن را مصرف نماید. قطع ناگهانی دارو احتمالاً سبب شروع ناگهانی آریتمی، هیپرتانسیون و ایسکمی میوکارد خطرناکی می گردد.
- ☑ به بیمار و خانواده اش چگونگی کنترل نبض و فشارخون را آموخته و توصیه کنید نبض را روزانه و فشارخون را حداقل هفته ای یکبار کنترل نمایند و در صورت افت نبض به کمتر از 50 ضربه در دقیقه و تغییرات قابل توجه فشارخون، مصرف دارو را به طور موقت قطع نموده و پزشک را مطلع سازد.
- ☑ مصرف این دارو سبب خواب آلودگی می گردد، بنابراین به بیمار توصیه نمائید از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ☑ به بیمار تذکر دهید که مصرف این دارو باعث حساسیت زیاد بدن نسبت به گرما می گردد.
- ☑ در بیماران دیابتیک باید سطح قندخون دقیقاً کنترل گردد. بخصوص وقتی که بیمار دچار ضعف، خستگی و تحریک پذیری می گردد.
- ☑ به بیمار بیاموزید کندی نبض، سرگیجه، گیجی و حواس پرتی، کنفوزیون، افسردگی یا راش پوستی را به پزشک

اطلاع دهد.

مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر ترشح می شود، تغذیه با شیر مادر در حین درمان با این دارو توصیه نمی شود.

تکلی دیس ریتمی : زیاد و نا منظم

فلوکروموسیتوم : تومور در غده فوق کلیه

ترمورهای اولیه : لئوشهای اولیه

POVIDONE IODINE h

Acu-dyne, Betadine, Biodine, Efodine, Frepp, Iodo-P, Lodex, Isodine, Operand, Pharmadine, Polydine, Sepp

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : ضد عفونی کننده حاوی ید

• طبقه‌بندی درمانی : ضد عفونی کننده موضعی

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

• فرآورده‌های ژنریک ایران

Shampoo: 7.5% (140 ml)

Surgical Scrub: 7.5% (250, 1000, 3800 ml)

Topical Ointment: 10%

Topical Solution: 2.5%

Topical Solution: 10% (60, 250, 1000, 3800 ml)

Vaginal Gel: 10% (80 g)

Vaginal Douche: 10%

Vaginal Suppositories: 200 mg

Tissue: 3 mg/cm²

Sponge: 7.5%

• اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

شستشو و ضد عفونی پوست قبل و بعد از جراحی

بیماری‌های التهابی عفونی شده دهان و حلق

درمان یا پیشگیری از عفونت در بریدگی‌ها، خراشیدگی‌ها و سوختگی‌ها؛ هرگونه بیماری چرکی پوست

سبوره، خارش، پوسته‌ریزی، اگزودا و قرمزی پوست سر

التهاب واژن ناشی از کاندیدا، تریکوموناس؛ التهاب غیراختصاصی واژن و شستشوی واژن قبل از جراحی

اگزودا: چرك - ترشح

PREDNISOLONE

Cortalone, Delta-Cortef, Prelone

طبقة بندی فارماکولوژیک : گلوکوکورتیکوئید، مینرالوکورتیکوئید

طبقة بندی درمانی : ضد التهاب، ساپرس کننده سیستم ایمنی

طبقة بندی مصرف در حاملگی : گروه C (در سه ماهه اول بارداری: گروه D)

فرآورده های ژنریک ایران

Tablets: 5 mg

اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

التهاب شدید و ساپرس کردن سیستم ایمنی

درمان جایگزینی در نارسایی بخش قشری غده آدرنال

کنتر اندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتر اندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط ● بیماران مبتلا به عفونتهای قارچی سیستمیک (بجز در موارد نارسا: آدرنال).

موارد احتیاط: ○ زخمهای دستگاه گوارش ○ بیماریهای کلیوی ○ هیپرتانسیون ○ استئوپوروز ○ دیابت ملیت ○ اختلالات ترومبوآمبولیک ○ تشنج ○ میاستی گراو ○ نارسایی احتقانی قلب ○ توپرکولوز ○ هیپوآلبومینمی ○ هیپوتیروئیدسم ○ سیروز کبدی ○ وابستگی روانی ○ هیپرلیپیدمی ○ گلوکوم ○ کاتاراکت.

خطر بروز عوارض جانبی گوارشی بدنبال مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی یا آسپیرین افزایش می یابد.

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ به منظور پیشگیری از بروز تحریک دستگاه گوارش، بهتر است قرص پردنیزولون را همراه غذا تجویز نمود.

✓ دارو را در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ و بدور از نور نگهداری نمائید.

پیگیری و بررسی تأثیر دارو:

✓ جهت جلوگیری از بروز سندرم قطع مصرف دارو، دارو را بتدریج قطع کنید.

✓ قبل از شروع درمان فشارخون، میزان I&O، وزن بیمار و وضعیت خواب وی را ارزیابی کنید.

آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار بیاموزید، دارو را درست مطابق تجویز بکار برده و از حذف یا دوبرابر نمودن دوز دارو بخواه

فراموش نمودن دوز قبلی پرهیز نماید. به بیمار توصیه نمائید قطع ناگهانی دارو باعث بی کفایتی آدرنال

(بی اشتها، تهوع، ضعف، سستی، افت فشارخون، تنگی نفس، هیپوگلیسمی) می گردد. بنابراین در صورت بروز

این علائم فوراً پزشک را در جریان بگذارد. این مسئله می تواند حیات فرد را به مخاطره بیندازد.

☒ بیماران تحت درمانهای طولی مدت را به مصرف غذاهای پرپروتئین، پرکالری، پرپیتاسیم، کم سدیم و کم کربوهیدرات تشویق نمائید.

☒ مصرف این دارو باعث سرکوب ایمنی شده و ممکن است علائم عفونت را مخفی سازد.

☒ به بیمار بیاموزید در صورت بروز درد شدید شکمی و قیری شدن مدفوع، سریعاً پزشک را مطلع سازد. همچنین بیمار

باید تورم، افزایش وزن، خستگی، درد استخوان، کوفتگی غیر معمول، عدم بهبود زخمها، اختلالات بینایی یا

تغییرات رفتاری اش را گزارش نماید.

☒ به بیمار تذکر دهید بدون مشورت پزشک از انجام هر نوع واکسیناسیون پرهیز نماید.

مصرف در دوران شیردهی

RIFAMPIN (RIFAMPICIN) h

Rifadin, Rimactane

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مشتقات نیمه‌صناعی ریفامایسین B (آنتی‌بیوتیک
ماکروسیدیک)

• طبقه‌بندی درمانی : ضدسل

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

❖ فرآورده‌های ژنریک ایران

Capsules: 150 mg

Capsules: 300 mg

Oral Drops: 153 mg/ml

For Injection: 600 mg/Vial

❖ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

درمان اولیه در سل ریوی

پروفیلاکسی در مقابل هموفیلوس آنفلوآنزای تیپ B

ناقلین بدون علامت مننگوکوک

❖ کنترل اندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط به هریک از ترکیبات ریفامایسین.
موارد احتیاط: ○ بیماری کبدی.

❖ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ ابتدا هر ویال ۶۰۰mg را در ۱۰ml آب مقطر رقیق کنید تا محلول ۶۰mg/ml* از دارو تهیه شود. سپس دوز لازم را کشیده و بهتر است در ۵۰۰ml D5W رقیق‌تر کنید.
✓ در صورتی که استفاده از دکستروز منع مصرف داشته باشد، را می‌توان از نرمال سالین استفاده کرد هرچند که پایداری دارو کاهش می‌یابد.

✓ دارو را با معده خالی (یکساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا) تجویز نمایید.
✓ دارو را در ظروف دربسته و دور از رطوبت و درجه حرارت ۱۵-۳۰°C نگهداری کنید.

❖ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار توصیه کنید که دارو را مطابق دستور مصرف نماید و در صورت فراموش نمودن یک دوز دو برابر کردن یا حذف دوزهای دارو پرهیز نماید.

براهمیت تداوم درمان علیرغم برطرف شدن علایم تأکید نمائید. دوره درمانی معمولاً یک تا ۲ سال به طول می انجامد. بیماران تحت درمان پیشگیری کننده کوتاه مدت باید از اهمیت درمان آگاه شوند.

- ⊠ به بیمار توصیه کنید بروز علایم و نشانه های هیاتیت (زردی پوست و چشم، تهوع، استفراغ، بی اشتها، برجستگی غیر معمول، ضعف و بی حالی) یا ترومبوسیتوپنی (خونریزی و کبودشدگی غیر معمول) را به پزشک اطلاع دهد.
- ⊠ به بیمار بیاآموزید علایم سندرم شبه آنفلوآنزا (تب، لرز، درد عضلانی، سردرد) را فوراً به پزشک گزارش نماید.
- ⊠ مصرف ریفامپین به ندرت باعث خواب آلودگی می شود. به بیمار تأکید کنید تا مشخص نشدن تأثیر درمان از رانندگی یا سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ⊠ به بیمار بیاآموزید بزاق، خلط، عرق، اشک، ادرار و مدفوعش به رنگ زرد متمایل به نارنجی یا قرمز متمایل به قهوه ای در می آید. همچنین مصرف این دارو ممکن است باعث تغییر رنگ لنزهای تماسی نرم گردد.
- ⊠ برای بیمار شرح دهید که این دارو یک تراژورن است. بنابراین در مورد استفاده از شیوه های غیرهورمونی پیشگیری از بارداری با پزشک مشورت نماید.

❁ مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر ترشح می شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.

SALBUTAMOL

Butamol, Proventil, Ventalex, Ventilor, Ventolin, Ventolin Inhaler

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک: سمپاتومیمتیک

• طبقه‌بندی درمانی: گشادکنندهٔ برونش

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه C

• فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 2 mg (as Sulfate)

Syrup: 2 mg/5 ml (as Sulfate)

Solution For Inhalation: 2.5 mg/2.5 ml

Solution For Inhalation: 5 mg/ml (as Sulfate)

Aerosol: 100 mcg/Dose (200 Doses)

Injection: 0.5 mg/ml (1 ml) (as Sulfate)

• اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

اسپاسم برونش در بیماران مبتلا به بیماری‌های انسدادی برگشت‌پذیر ریه

پروфіلاکسی از اسپاسم برونش ناشی از فعالیت‌های بدنی

• کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: • حساسیت مفرط به سمپاتومیمتیک‌ها.

• توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ قرص و شربت سالبوتامول را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و درجه حرارت $2-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمایید.

• آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار بیاموزید دارو را کاملاً مطابق دستور مصرف نماید.

• مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر ثابت نشده و عوارضی برای آن در انسان گزارش نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.

Streptocin

ml xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

STREPTOMYCIN Sulfate

طبقه‌بندی فارماکولوژیک : آمینوگلیکوزید
طبقه‌بندی درمانی : آنتی‌بیوتیک
طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه D

فرآورده‌های ژنریک ایران

For Injection: Streptomycin 1 g/Vial

اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ
درمان اولیه یا کمکی در سل
اندوکاردیت انتروکوکال
تولارمی

کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط نسبت به این دارو و سایر آمینوگلیکوزیدها.
موارد احتیاط: ○ اختلال عملکرد کلیه ○ وزوز گوش ○ ورتیگو ○ کاهش شنوایی فرکانس‌های بالا ○
دهیدراتاسیون ○ میاستنی گراو ○ پارکینسونیسم ○ هیپوکلسمی ○ نوزادان و سایر شیرخواران ○ بیماران مسن.

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ از تماس مستقیم با دارو خودداری کنید، بهتر است هنگام تهیه محلول تزریقی از دستکش استفاده نمایید.
- ✓ دارو را می‌توان در درجه حرارت اتاق نگهداری نمود.
- ✓ محلول آماده شده استریل‌تومایسین را باید بلافاصله بعد از تهیه تزریق نمود.
- ✓ در صورت قرار گرفتن محلول در معرض نور، رنگ آن مختصری تیره خواهد شد ولی اختلالی در میزان تأثیر آن ایجاد نمی‌شود.

آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار پیاموزید بروز علایمی چون وزوز گوش، حساسیت مفرط، سرگیجه، یا از دست دادن قدرت شنوایی را سریعاً به پزشک گزارش نماید.

مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر ترشح می‌شود. ولی باتوجه به اینکه جذب این دارو از دستگاه گوارش ناچیز است، بعید بنظر می‌رسد که مصرف آن در دوران شیردهی عوارضی به همراه داشته باشد.

اندوکاردیت انتروکوکال : التهاب قلب بدلیل انتروکوک

SULFACETAMIDE Sodium (Ophthalmic) h

Ak-Sulf Forte, Cetamide, Isopto Cetamide, Sulamyd, Sulfacetamide-SD, Sulf-IO.

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : سولفونامید

• طبقه‌بندی درمانی : آنتی‌بیوتیک چشمی

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

❖ فرآورده‌های ژنریک ایران

Sterile Eye Drops: 10%

Sterile Eye Drops: 20%

❖ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

کونژکتیویت انکلوژیون؛ زخم‌های قرنیه؛ تراخم؛ پروفیلاکسی در مقابل عفونت‌های چشم

❖ کنترل اندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیون‌ها: ● حساسیت شناخته شده به سولفونامیدها.

❖ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را در ظروف دربسته و درجه حرارت 5°C تا 15°C نگهداری نمایید. در صورت کدر شدن رنگ محلول از آن استفاده ننمائید.

❖ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☐ به بیمار پیاموزید علیرغم احساس بهبودی، دارو را مطابق دستور بکار برده و در صورت فراموش نمودن یک دوز، بلافاصله پس از بخاطر آوردن آن را به مصرف برساند، مگر اینکه فرصتی تا نوبت بعدی وجود نداشته باشد.

☐ به بیمار توصیه کنید در صورت عدم بهبودی ظرف ۷-۸ روز پس از مصرف دارو، تشدید علائم، ایجاد درد، خارش یا تورم موضعی در چشم‌ها به پزشک اطلاع دهد.

☐ به بیمار دچار عفونت‌های چشمی تذکر دهید تا بهبود عفونت و تأیید پزشک از کاربرد لنزهای تماسی خودداری نماید.

❖ مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است.

... کونژکتیو انکلوژیون : التهاب چشم

SILVER SULFADIAZINE h

Flind SSD, Silvadene, Silver Sulfadiazine-Najo

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : ضد عفونت صناعی

• طبقه‌بندی درمانی : ضد باکتری موضعی

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

🔗 فرآورده‌های ژنریک ایران

Topical Cream: 10 mg/g (50, 500 g)

🔗 اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

درمان کمکی جهت جلوگیری و درمان عفونت زخم در سوختگی‌های درجه ۲ و ۳

🔗 کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط به این دارو و ترکیبات آن ● نوزادان کوچکتر از ۲ ماه ● نوزادان نارس.
موارد احتیاط: ○ اختلال عملکرد کبد یا کلیه.

🔗 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ سیلورسولفادiazین محلول در آب و سفید رنگ است، در صورت تیره شدن رنگ آن، از تجویز آن خودداری نمایید.
- ✓ در صورت امکان، بیمار باید هر روز استحمام کند و سپس از پماد استفاده نماید.
- ✓ پانسمان ضرورت ندارد ولی در صورت نیاز می‌توان از آن استفاده کرد. سولفادiazین لباس بیمار را رنگی نمی‌نماید.
- ✓ دارو را دور از حرارت و درجه حرارت اتاق نگهداری نمایید.

مصرف دارو را تا زمان پاسخ درمانی مناسب و یا آماده شدن پوست جهت گرافت ادامه دهید.

🔗 آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار توصیه نمایید در هنگام مصرف این دارو در معرض نور خورشید قرار نگیرد.

🔗 مصرف در دوران شیردهی

در خلال مصرف این دارو و تا چند روز بعد از قطع دارو، تغذیه با شیر مادر توصیه نمی‌شود.

TRIPLE SULFA (Vaginal) h

Dayto Sulf, Femguard, Gyne-Sulf, Sulfa-Gyn, Sulfa-Trip, Triplesulfa-Najo, Trysul, Three Sufsa, V.V.S.

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : سولفونامید

• طبقه‌بندی درمانی : آنتی‌بیوتیک واژینال

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

• فرآورده‌های ژنریک ایران

	Vaginal Cream	Vaginal Tablets
Sulfathiazole	3.42%	172.5 mg
Sulfacetamide	2.86%	143.75 mg
Sulfabenzamide	3.7%	184 mg

• اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

التهاب ولوواژینال ناشی از کاندیدا آلبیکانس، تریکوموناس واژینالیس و هموفیلوس واژینالیس (گاردنلا واژینالیس)

• آموزش بیمار / خانواده

واژینال: ☒ به بیمار توصیه نمایید دوره درمان را حتی در صورت شروع قاعدگی ادامه دهد و در صورت فراموش کردن یک دوز دارو، به محض بیدار شدن آن را مصرف نماید ولی اگر زمان مصرف دوز بعدی فرارسیده باشد از مصرف آن خودداری نماید.

☒ به بیمار تذکر دهید برای جلوگیری از بروز عفونت مجدد، همسر بیمار باید از کاندوم استفاده کند.

• مصرف در دوران شیردهی

این دارو از واژن جذب می‌شود و در شیر ترشح می‌شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

ولوواژینال : لبه‌ای واژن

هموفیلوس : ویروس هموفیلوس

THIORIDAZINE HCl

Apo-thioridazine, Mellaril, Millazine, Novoridazine, PMS Thioridazine

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: فنوتیازین (مشتقات پی‌پریدین)

طبقه‌بندی درمانی: ضدسایکوز

طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه C

فرآورده‌های ژنریک ایران

Coated Tablets: 10 mg

Coated Tablets: 25 mg

Coated Tablets: 100 mg

اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

سایکوز

اختلال دیس‌تایمیک (افسردگی نوروتیک)؛ قطع الکل؛ دمانس در بیماران مسن؛ مشکلات رفتاری در کودکان

کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: حساسیت مفرط به فنوتیازین‌ها • دیس‌کرازیه‌های خونی • دپرسیون مغز استخوان • کوما • ضایعات مغزی • دپرسیون CNS • کلاپس عروقی • بیماری‌های عروق مغز • مصرف بتابلوکرها.
موارد احتیاط: دیس‌ریتمی‌های قلبی • نارسایی احتقانی قلب • آنژین صدری • بیماری‌های دریچه‌ای قلب • بلوک قلبی • انسفالیت • سندرم ری • تروما به سر • بیماری‌های ریوی • اپی‌لپسی • گلوکوم • هیپرتروفی پروستات • احتباس ادراری • بیماری پارکینسون • فنوکروموسیتوم • هیپوکالسمی.

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ قرص تیوریدازین را می‌توان قبل از تجویز خرد نمود و بصورت مخلوط با مایعات تجویز کرد.
- ✓ فنوتیازین‌ها را باید یک‌ساعت قبل و یا بعد از سایر داروها، بخصوص آنتی‌اسیدها و داروهای ضداسهال تجویز نمود.
- ✓ دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمایند.

آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: بیمار را تشویق نمائید، دارو را کاملاً مطابق دستور مصرف نموده و از حذف یا دوبرابر کردن دوز دارو پرهیز نماید. در صورت فراموش نمودن یک دوز، بلافاصله پس از بیدار آوردن آن را مصرف نماید ولی اگر دستور مصرف دارو بیش از دو بار در روز است، دوز فراموش شده را باید ظرف یک ساعت پس از زمان برنامه ریزی شده مصرف نموده و یا از مصرف آن خودداری نماید. قطع ناگهانی دارو باعث گاستریت، تهوع، استفراغ، گیجی، سردرد، تاکیکاردی و بیخوابی می گردد.
- برای بیمار احتمال بروز اکسترایپیرامیدال و دیسکینزی تأخیری را توضیح داده و به او توصیه نمائید که بروز این علائم را فوراً اطلاع دهد.
- جهت جلوگیری از هیپوتانسیون ارتوستاتیک به بیمار تذکر دهید که از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نماید.
- مصرف این دارو احتمالاً باعث خواب آلودگی می گردد. بنابراین به بیمار توصیه نمائید که از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- به بیمار توجه دهید که باید از مصرف همزمان داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی پرهیز نماید.
- به بیمار بیاموزید بروز احتباس ادرار، حرکات غیرقابل کنترل، راش، تب، زردی پوست، خشکی دهان و یبوست مقاوم را به پزشک گزارش نماید.

به بیمار توضیح دهید که مصرف این دارو باعث تغییر رنگ ادرار به صورتی یا قرمز متمایل به قهوه ای خواهد شد.

مصرف در دوران شیردهی

این دارو ممکن است در شیر ترشح شود. منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.

نماتس : زوال عقل

اختلال دیس تانمیک : اختلال در درک زمان

TRIHXYPHENIDYL HCl h

Aphen, Artane, Artane Sequels, Tremin, Triphen, Trihexane, Trihexidyl, Trihexy-2, Trihexy-5

طبقة بندی فارماکولوژیک : آنتی کولینرژیک

طبقة بندی درمانی : ضد پارکینسون

طبقة بندی مصرف در حاملگی : گروه C

فرآورده های ژنریک ایران

Tablets: 2 mg

Scored Tablets: 5 mg

اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

پارکینسونیسم ناشی از داروها

کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیونها: ● سابقه حساسیت به این دارو.

موارد احتیاط: ○ گلوکوم زاویه باریک ○ بیماریهای قلبی ○ آرتریواسکلروز ○ بیماریهای کلیوی ○ بیماری کبدی ○ هیپرتانسیون ○ انسداد دستگاه گوارش ○ بیماریهای دستگاه ادراری - تناسلی ○ هیپرتروفی پروستات.

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را می توان قبل یا بعد از غذا تجویز کرد. در بیماران مسن و افرادی که ترشح بزاق بیش از حد دارند، بهتر است دارو را بعد از غذا تجویز نمود. در صورت بروز خشکی بیش از حد دهان، بهتر است دارو را قبل از غذا تجویز کرد.

✓ دارو را در ظروف دربسته و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری کند.

آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☐ به بیمار بیاموزید دارو را کاملاً مطابق دستور بکار برده و دوز فراموش شده را بلافاصله پس بخاطر آوردن مصرف نماید، مگر اینکه کمتر از ۲ ساعت تا زمان دوز بعدی باقی مانده باشد. همچنین باید از دوبار کردن دوزهای دارو پرهیز نماید.

☐ هنگام قطع دارو باید دوز آن را تدریجاً کاهش دهید، در غیر این صورت بیمار دچار علائم سندرم محرومیت (اضطراب، تاکیکاردی، بی خوابی، برگشت علائم پارکینسونی یا اکستراپیرامیدال) خواهد شد.

☐ مصرف این دارو سبب خواب آلودگی یا سرگیجه می شود. به بیمار توصیه نمائید از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☐ به بیمار توصیه نمائید جهت کاهش احتمال بروز هیپوتانسیون وضعیتی از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نماید.

☐ مصرف این دارو باعث کاهش تعریق می گردد. به همین جهت ممکن است فرد تحت درمان در آب و هوای گرم دچار گرمازدگی شود. به بیمار توصیه نمائید در محل سکونت یا کارش از تهویه استفاده نموده و تا حد ممکن از بیرون رفتن خودداری نماید.

☐ به بیمار توصیه نمائید بروز علائمی چون تیرگی شعور، راش، احتباس ادرار، یبوست شدید یا تغییرات بینایی را به پزشک اطلاع دهد.

مصرف در دوران شیردهی

TRIAMTERENE-H

Dyazide, Maxzide

طبقة بندی فارماکولوژیک : دیورتیک نگهدارنده پتاسیم

طبقة بندی درمانی : دیورتیک

طبقة بندی مصرف در حاملگی : گروه C (در هیپرتانسیون حاملگی: گروه D)

فرآورده های ژنریک ایران

Tablets:

Triamterene 50 mg and

Hydrochlorothiazide 25 mg

اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

دیورز (پرادراری)

کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: ● پتاسیم سرم بالاتر از 5.5 mEq/L ● مصرف همزمان با سایر دیورتیکهای نگهدارنده پتاسیم ● آنوری ● نارسایی حاد و مزمن کلیه ● نفروپاتی دیابتیک ● حساسیت مفرط. موارد احتیاط: ○ نارسایی شدید کبد ○ دیابت.

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ به منظور کاهش بروز تهوع، دارو را همراه یا بعد از غذا تجویز کنید.
- ✓ جهت جلوگیری از بیدار شدن از خواب جهت ادرار کردن، دوز دارو را بنحوی تنظیم کنید که بصورت دوز منفرد و همراه یا بعد از صبحانه باشد و در صورتی که باید دو دوز در روز تجویز شود، دوز دوم قبل از ساعت ۶ بعد از ظهر باشد.
- ✓ در صورت مصرف طولانی مدت، قطع دارو باید تدریجی باشد.
- ✓ دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری کنید.

آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: □ بر اهمیت تداوم مصرف دارو علیرغم احساس بهبودی تأکید نموده و به بیمار بیاموزید دارو را هر روز در زمان ثابتی بکار برده و در صورت فراموش نمودن یک دوز، بلافاصله پس از یادآوردن آن را مصرف نماید، مگر اینکه تقریباً فرصتی تا زمان نوبت بعدی وجود نداشته باشد.
- به بیمار توضیح دهید بدون تجویز پزشک از مصرف نمکهای جایگزین و غذاهای حاوی مقادیر زیاد پتاسیم و سدیم پرهیز نماید.
- به بیمار توضیح دهید که ممکن است مصرف تریامترن باعث تغییر رنگ ادرار به آبی گردد.
- به بیمار بیاموزید که بروز کرامپ عضلانی، سستی و ضعف، تهوع شدید و استفراغ - اسهال را به پزشک اطلاع دهد.

مصرف در دوران شیردهی

(VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN

Bay Bee-12, Berubigen, Betalin 12, Bitavion, Cabadon-M, Cobex, Crystimin-1000, Cyanem, Cyanoject, Cyomin, Kaybovite-1000, Pernavit, Redisol, Rubesol-1000, Rubramin PC, Sytobex, Vibal, Vibalmin

طبقه‌بندی فارماکولوژیک : ویتامین محلول در آب

طبقه‌بندی درمانی : ویتامین، مکمل غذایی

طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه A (در صورت مصرف بیش از مقادیر توصیه شده: گروه C)

فرآورده‌های ژنریک ایران

Injection: 100 mcg/ml

اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

کمبود ویتامین B12 ناشی از هر علتی بجز سوءجذب ناشی از آنمی پرنیسیوز و سایر بیماری‌های گوارشی

آنمی پرنیسیوز یا سوءجذب ویتامین B12

اسیدوری متیل‌مالونیک

تست تشخیصی کمبود ویتامین B12

تست شیلینگ (Flushing dose)

کنترل اندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیون‌ها: ● حساسیت شناخته شده به کبالت یا ویتامین B12 ● آنروپی اکتسابی عصب بینایی.
موارد احتیاط: ○ نقرس ○ بیماری‌های قلبی.

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را باید در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمود.

آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمارانی که بدون تجویز پزشک مبادرت به مصرف ویتامین‌ها می‌نمایند دوز مجاز را تذکر داده گوشزد نمایند مصرف بیش از اندازه ویتامین‌ها نه تنها باعث افزایش تأثیر آنها در بدن نمی‌شود، بلکه حتی ممکن است منجر به بروز عوارض جانبی گردد.

☒ به بیمارانی که تحت عمل گاسترکتومی قرار گرفته یا ایلئوم آنها برداشته شده است توضیح دهید که باید این دارو را در تمام طول زندگی مصرف نمایند.

آنمی پرنیسیوز : فقر فولیک اسید

VITAMIN B1 (THIAMINE HCL) h

Beramin, Betaline S, Thiavit, Tiamax

طبقه‌بندی فارماکولوژیک : ویتامین محلول در آب

طبقه‌بندی درمانی : مکمل غذایی

طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه A (در صورت مصرف بیش از مقادیر توصیه شده: گروه C)

فرآورده‌های ژنریک ایران

Scored Tablets: 100 mg

Tablets: 300 mg

اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

بری‌بری

آنمی ناشی از کمبود تیامین؛ پلی‌نوریت ثانویه به الکلیسم، حاملگی و بیماری پلاگر

کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● احتمال حساسیت به ویتامین B₁

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و غیرفلز، نگهداری نمائید.

آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمارانی که بدون تجویز پزشک مبادرت به مصرف ویتامین‌ها می‌کنند توصیه نمائید که میزاج مصرفشان نباید از حد مجاز شناخته شده بیشتر شود.

مصرف در دوران شیردهی

مصرف دارو در مقادیر توصیه شده در دوران شیردهی مجاز است.

معني برخي اصطلاحات

تایدو توکسیوکوز :	آلودگی به توکسیدوز	نفروپاتی دیابتی :	اختلال در کار کلیه بیماران دیابتی
میوکلونوس شبانه :	تیک عصبی شبانه	هموفیلوس :	ویروس هموفیلوس
آتیبیک :	غیر نرمال	فنوکروموسیتوم :	تومور در غده فوق کلیه
اپی زودهای ماتیک حاد :	حملات ماتیک حاد	کونژکتیو انکلوژیون :	التهاب چشم
نورالژی :	التهاب عصبی	کاتاپلکسی :	حملات ناگهانی و موقت از دست رفتن
نورالژی تری ژمینال :	التهاب عصب سه قلو (عصب گونه ای)		تونوس عضلات و یا فلج در طی روز
استاتوس اپی لپتیکوس :	صرع پایدار یا مداوم	میوکلونوس :	انقباض ناگهانی و بدون نظم عضلات
هیپر تری گلیسریدمی :	تری گلیسرید بالا	بیماری منبیر :	افزایش مایع درون گوش داخلی و عدم تعادل
هیپر کلسترولمی :	کلسترول بالا	هایپر تاتیسیون :	فشار خون بالا
ریفلاکس گاستروازوفازیا :	برگشت محتویات معده به مری	اسپاستیسمی در مولتیپل اسکلروزیس :	سفتی عضلات
دمانس :	زوال عقل	سپارس کردن :	جلوگیری کردن
نفروپاتی :	اختلال کار کلیه	دیورز :	پر ادراری
دیس ریتمی :	نا منظم	آتمی پریمیوز :	فقر فولیک اسید
ناکی دیس ریتمی :	زیاد و نا منظم	درد نوروزنیک :	درد با منشأ درگیری عصبی
پارکینسونیسم :	دارای بیماری پارکینسون	تشنج ژنرالیزه تونیک - کلونیک :	تشنج عمومی دارای حالت انقباضی مداوم
کلرا :	وبا		و انقباضها و انقباضهای مکرر
تریکوریدوز :	آلودگی به تریکوموناس	بیماری کره :	بیماری ارثی با مشخصه لرزش و زوال عقل
اسکاریدوز :	آلودگی به آسکاریس	اندوکاردیت انتروکوکال :	التهاب قلب بدلیل انتروکوک
ولوواژینال :	لپهای واژن	گراندمال :	صرع بزرگ که با بیهوشی همراه است
نرمورهای اولیه :	لرزشهای اولیه	ارتوستاتیک :	وضعیتی
اگزودا :	چرک - ترشح	انکلیسم :	معتاد به الکل
ایدیوپاتیک :	ناشناخته	صرع ایمنس (پتی مال) :	صرع کوچک
اختلال دیس تایمیک :	اختلال در درک زمان	دیس پنه :	تنفس مشکل
تشنج کمپلکس پارشیال :		آپنه پریدیک :	قطع تنفس گذرشی