

بسمه تعالی

جزوه آموزشی

داروهای ژنریک (۶)

پس از مطالعه این بخش از فراگیر انتظار می رود با :

۱ - نام تجاری گروهی از داروهای مطرح شده

۲ - طبقه بندی مصرف دارو در حاملگی

۳ - فراورده های موجود

۴ - موارد مصرف

۵ - موارد احتیاط

۶ - نکات قابل توصیه به بیمار

۷ - مصرف دارو در دوران شیر دهی

آشنا شود

واحد دارویی معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

استان همدان

منبع : بانک اطلاعات الکترونیک داروهای ژنریک ایران ، تالیف آقای دکتر رامین خدام

فهرست

شماره صفحه	نام دارو	شماره صفحه	نام دارو	شماره صفحه	نام دارو
۴۸	فلوکونازول	۲۶	ترئینوین	۱	فهرست
۵۰	کتوکونازول	۲۷	ترانگزامیک اسید	۲	آزیترومایسین
۵۱	کلشی سین	۲۸	ستریزین	۴	آلوپورینول
۵۳	گریزوفولوین	۲۹	سیپروهیتادین	۵	آلندرونات
۵۴	متی مازول	۳۰	سولفاسالازین	۶	آمانتادین
۵۵	متوپرولول	۳۱	سوکرالفیت	۷	آملودیپین
۵۶	موپیروسین	۳۲	سینارازین	۸	آتروواستاتین
۵۷	متیل ارگنوفین	۳۳	سیتالوپرام	۹	استرادیول
۵۸	میدازولام	۳۴	سوربیتول	۱۱	اسپکتینومایسین
۵۹	مدروکسی پروژسترون	۳۵	جم فیبروزیل	۱۲	الانزاپین
۶۱	نیتروفورانتوین	۳۶	دوپامین	۱۳	استازولامید
۶۲	ناپروکسن	۳۷	دیفنوکسیلات	۱۵	اسپیرونولاکتون
۶۴	نیکلوزاماید	۳۸	دی هیدروارگوتامین مسیلات	۱۷	ایزوسورباید
۶۵	نالوکسان	۳۹	دکسپانتانول	۱۸	افلوکساسین
۶۶	وارفارین	۴۰	لیندان	۱۹	اوندانسترون
۶۷	والسارتان	۴۱	لاکتولوز	۲۰	بی پردین
۶۸	وراپامیل	۴۲	لوودوپاسی	۲۱	بروموکریپتین
۷۰	یدوکینول	۴۴	لوراتادین	۲۳	بیسموت
		۴۵	لوپرامید	۲۴	بتا هیستین
		۴۶	فلوفنازین	۲۵	پرمترین

AZITHROMYCIN h

Azirocin, Zithromax

● طبقه‌بندی فارماکولوژیک : آزالید ماکرولید

● طبقه‌بندی درمانی : آنتی‌بیوتیک

● طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه B

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 250 mg (as Dihydrate)

Capsules: 250 mg (as Dihydrate)

Tablets: 500 mg (as Dihydrate)

Capsules: 500 mg (as Dihydrate)

For Suspension: 100 mg/5 ml (as Dihydrate) (30 ml)

For Suspension: 200 mg/5 ml (as Dihydrate) (30 ml)

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

عفونت‌های ریوی ناشی از هموفیلوس آنفلوآنزا، موراکسلاکاتارالیس یا استرپتوکوک پنومونیه؛ عفونت‌های بدون عارضه پوست ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوک پیوژن و خط دوم درمان تونسیلیت یا فارنژیت ناشی از استرپتوکوک پیوژن پنومونی ناشی از کلامیدیا پنومونیه، هموفیلوس آنفلوآنزا، میکوپلاسما پنومونیه و استرپتوکوک پنومونیه

اوتیت میانی

تونسیلیت

شانکروئید

عفونت منتشر با کمپلکس مایکوباکتریوم اویوم (MAC) در بیماران مبتلا به عفونت پیشرفته با HIV

☞ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط نسبت به اریترومايسين و سایر ماکرولیدها.
موارد احتیاط: ○ اختلال عملکرد کبد.

📌 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

دارو را با معده خالی (یکساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا) تجویز نمایید.

📌 آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☐ به بیمار آموزش دهید تا دارو را با معده خالی مصرف نماید.
- ☐ به بیمار تذکر دهید بین مصرف آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم باید حداقل دو ساعت فاصله باشد.
- ☐ به بیمار توصیه کنید در صورت بروز اسهال آبی به پزشک مراجعه نماید.

📌 مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است؛ استفاده از این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.

ALLOPURINOL h

Lopurin, Zyloprim

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مهارکننده آنزیم گزانتین اکسیداز

• طبقه‌بندی درمانی : ضدنقرس

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 100 mg

Tablets: 300 mg

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

نقرس؛ هیپریوریسمی اولیه یا ثانویه

هیپریوریسمی ثانویه به بدخیمی

پیشگیری از نفروپاتی اسید اوریکی در خلال کموتراپی سرطان

عود سنگهای کلیوی اگزالات کلسیم

پیشگیری از حملات حاد نقرس

دوزاژ در نارسایی کلیه

☞ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط ● هموکروماتوز.

موارد احتیاط: ○ زنان باردار و دوران شیردهی ○ اختلال عملکرد کلیه ○ دپرسیون مغز استخوان ○ بیماریهای قس
تحتانی دستگاه گوارش ○ حمله حاد نقرس ○ کم آبی بدن (رسانیدن مایعات کافی به بیمار ضروری است).

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ بهتر است دارو را بعد از غذا مصرف نمود. در صورت لزوم می‌توان قرص را خرد و همراه مایعات و یا غذا مصرف کرد.
✓ در صورت استفاده این دارو همراه با داروهای ضدسرطان، مصرف آلپورینول باید یک تا دو روز قبل از شروع کموتراپی
آغاز شود.

☞ آموزش بیمار / خانواده

خوراکی: ☐ بیمار باید در صورت فراموش نمودن یک نوبت، در اولین فرصت ممکن، آن را مصرف نماید.
☐ بیمار باید در طی درمان از غذاهای قلیایی استفاده کند. زیرا اسیدی شدن ادرار احتمال ایجاد سنگهای کلیوی را افزایش
می‌دهد. همچنین میزان مصرف مایعات باید افزایش یابد.
☐ بیمار باید بروز علایم افزایش حساسیت نظیر راش، خارش، لرز، تب، تهوع و استفراغ را حتماً اطلاع دهد.

☞ مصرف در دوران شیردهی

بعلت ترشح آلپورینول به داخل شیر مادر، مصرف این دارو در زنان شیرده باید با احتیاط کامل صورت گیرد.

ALENDRONATE (as Sodium) h

Alenate, Fosamax, Ostomod

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مهارکننده بازجذب استخوان ناشی از استئوکلاست‌ها

• طبقه‌بندی درمانی : ضد استئوپوروز

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 10 mg

Tablets: 35 mg

Tablets: 70 mg

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

استئوپوروز در زنان بعد از یائسگی

بیماری پاوره استخوانی

پیشگیری از استئوپوروز در زنان بعد از یائسگی

استئوپوروز ناشی از کورتیکواستروئیدها (همراه با مکمل‌های کلسیم و ویتامین D)

☞ کنترل اندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیون‌ها: • حساسیت به هریک از اجزای دارو • هیپوکلسمی • نارسایی کلیه (کلیرانس کراتینی نین کمتر 35ml/min)
موارد احتیاط: ○ اختلالات فعال دستگاه گوارش فوقانی (دیسفاژی، بیماری‌های مری، گاستریت، دئودنیت و یا زخم پپتیک) ○ اختلالات عملکرد خفیف تا متوسط کلیه (کلیرانس کراتینی نین بین 35-60ml/min)

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ قبل از تجویز دارو، هیپوکلسمی بیمار باید اصلاح شود.
- ✓ دارو را باید ۳۰ دقیقه قبل از مصرف غذا، نوشیدنی و سایر داروها تجویز نمود.
- ✓ بین تجویز این دارو و مصرف غذاهای حاوی کلسیم باید حداقل دو ساعت فاصله باشد.
- ✓ جهت انفوزیون دارو بایستی 20ml از دارو با 230ml از نرمال سالین، D5/NS، D5W و یا LR ترکیب شود. غلظت پس از رقیق نمودن به 40mcg/ml خواهد رسید.
- ✓ حجم‌های کم را می‌توان به صورت رقیق‌نشده هم تجویز کرد.

☞ آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☐ نحوه صحیح مصرف دارو را به بیمار آموزش دهید.
- ☐ به بیمار تذکر دهید تا نیم‌ساعت بعد از مصرف دارو در حالت خوابیده قرار نگیرد.
 - ☐ به بیمار تذکر دهید در صورت بروز تب همراه با آرترالژی و میالژی به پزشک مراجعه کند.
 - ☐ به بیمار گوشزد شود که ورزش سبک، به افزایش توده استخوانی کمک می‌کند.

☞ مصرف در دوران شیردهی

بدلیل اینکه احتمال ترشح این دارو در شیر وجود دارد، مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

AMANTADINE HCl h

Ammorel, Symmetrel

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آمین حلقوی صنعتی

طبقه‌بندی درمانی: ضد ویروس، ضد پارکینسونیسم، آنتی کولینرژیک

طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه D

فرآورده‌های ژنریک ایران

Capsules: 100 mg

اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

پروویلاکسی و یا درمان علامتی آنفلوآنزای ناشی از ویروس تیپ A، بیماری دستگاه تنفسی

در افراد مسن و یا بیماران ناتوان

درمان پارکینسونیسم ایدیوپاتیک؛ سندرم پارکینسونین (parkinsonian syndrome)

درمان واکنش اکستراپیرامیدال ناشی از داروها

کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط.

موارد احتیاط: ○ تاریخچه بیماری کبدی ○ تشنج ○ سایکوز ○ بیماری کلیوی ○ درمانیت اگزمایی راجعه ○ اپی‌لپسی ○ بیماریهای قلبی - عروقی (به خصوص نارسایی احتقانی قلب) ○ ادم محیطی ○ هیپوتانسیون ارتوستاتیک ○ زنان حامله و زنان در سنین باروری (بدلیل اثرات تراتوژنیک و آمبریوتوکسیک).

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ ترجیحاً از تجویز دارو در کودکان زیر یکسال، پرهیز نمائید.
- ✓ در صورت مصرف به عنوان پروویلاکسی از آنفلوآنزا، دارو باید بلافاصله بعد از تماس با فرد آلوده، شروع و حداقل ۱۰ روز ادامه یابد.
- ✓ در صورت مصرف به عنوان خواب‌آور، دارو باید چند ساعت قبل از خواب مصرف شود.
- ✓ آمانتادین را می‌توان همراه با آب، شیر و یا غذا مصرف نمود.
- ✓ دارو را باید در ظروف دربسته و در درجه حرارت 15-30°C نگهداری نمود.

آموزش بیمار / خانواده

- ☑ **خوراکی:** مصرف آمانتادین باعث سرگیجه و تاری دید می‌گردد. بنابراین تا مشخص نشدن پاسخ بدن نسبت به دار بیمار باید از رانندگی و سایر اموری که نیازمند هشیاری است، پرهیز کند.
- ☑ جهت کاهش بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نماید.
- ☑ جهت کاهش خشکی دهان، رعایت بهداشت دهان، شستشوی مکرر دهان بعد از صرف غذا یا نوشیدنی و مصرف شیرینی و آدامس کم شیرین لازم است.
- ☑ در صورت بروز علائم آنفلوآنزا (هنگام مصرف دارو به عنوان پیشگیری از آنفلوآنزا)، گیبجی، تغییرات خلقی، اشکال در دفع ادرار، ادم، تنگی نفس یا تشدید علائم بیماری پارکینسون به پزشک اطلاع داده شود.

مصرف در دوران شیردهی

آمانتادین در شیر مادر ترشح می‌شود. شیر دادن در زمان مصرف دارو باید قطع شود.

AMLODIPINE Besylate h

Amlopress, Modavask, Norvasc, Vasodipine

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : دی‌هیدروپیریدین، بلوک‌کننده کانال کلسیم

• طبقه‌بندی درمانی : ضد آنژین، ضد فشارخون، وازودیلاتور غیرنیترا ته

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 5 mg

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

آنژین مزمن پایدار، آنژین وازواسپاتیک (آنژین واریانت یا پرینژمتال)

فشار خون

☞ کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط به دارو.

موارد احتیاط : ○ مصرف همزمان با داروهای گشادکننده عروق محیطی ○ تنگی آئورت ○ نارسایی قاع
○ بیماری شدید کبدی.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را می‌توان بعد یا قبل از غذا مصرف نمود.

✓ بهتر است در افراد مسن و بیمارانی که از سایر داروهای ضد فشارخون نیز استفاده می‌نمایند، آملودیپین را با دوز 2.5mg در روز شروع نمود و در صورت نیاز هر ۷-۱۴ روز یکبار دوز دارو را افزایش داد.

✓ دارو را در درجه حرارت 15-30°C نگهداری نمائید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☐ به بیمار بیاآموزید تا در صورت بروز ادم شدید در اندام‌ها و یا صورت به پزشک مراجعه نماید.

☐ به بیمار بیاآموزید تا در صورت بروز طپش قلب، کوتاهی دامن تنفس، ضربان قلب نامنظم و یبوست به پزشک مراجعه نمایند.

☐ به بیمار بیاآموزید جهت جلوگیری از بروز هیپوتانسیون وضعیتی، از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نماید.

☞ مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است، با اینحال تغذیه با شیر مادر در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

ATORVASTATIN (as Calcium Trihydrate) h

Atovast, Lipastin, Lipimod, Lipitor

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مهارکنندهٔ ۳- هیدروکسی ۳- متیل گلو تاریل کوآنزیم A ردوکتاز

• طبقه‌بندی درمانی : کاهش‌دهنده چربی خون

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه X

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Film Coated Tablets: 10 mg

Film Coated Tablets: 20 mg

Film Coated Tablets: 40 mg

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

درمان کمکی جهت کاهش LDL، کلسترول تام و تری‌گلیسیرید در بیماران مبتلا به

هیپرکلسترولمی اولیه و یا دیس‌لیپیدمی

درمان کمکی در هیپرکلسترولمی فامیلیال هموزیگوس

درمان کمکی در هیپرکلسترولمی فامیلیال هتروزیگوس

☞ کنترل اندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط به دارو ● بیماری‌های فعال کبد ● دوران حاملگی ● دوران شیردهی
موارد احتیاط: ○ سابقه بیماری‌های کبدی

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را می‌توان قبل و یا بعد از غذا تجویز نمود.
✓ دارو را در درجهٔ حرارت 20-25 °C نگهداری کنید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☐ لزوم ورزش، کاهش وزن و رژیم غذایی را جهت کنترل بیماری توضیح دهید.

☐ به بیمار تذکر دهید در صورت تمایل به بارداری، حتماً پزشک را در جریان بگذارد.

☐ به بیمار تذکر دهید در خلال درمان با این دارو، حتی المقدور از داروهای دیگر استفاده ننماید.

☐ به بیمار آموزش دهید در صورت بروز درد عضلانی و ضعف به پزشک مراجعه نماید.

☞ مصرف در دوران شیردهی

بدلیل احتمال بروز عوارض جانبی در شیرخوار، تغذیه با شیر مادر در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

ESTRADIOL h

Delestrogen, Dioval, Dioval XX, Duragen, Estradiol L.A., Estraval, Gynogen L.A. IO, Valergen-IO

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : استروژن

• طبقه‌بندی درمانی : جانشین استروژن، ضدنئوپلاسم

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه X

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 1 mg (as Valerate)

Tablets: 2 mg (as Valerate)

Injection: 10 mg/ml (as Valerate)

Plaster: Estradiol S.R. 2 mg/5 cm² (25 mcg/24 h)

Plaster: Estradiol S.R. 4 mg/10 cm² (50 mcg/24 h)

Plaster: Estradiol S.R. 8 mg/20 cm² (100 mcg/24 h)

Patch: Estradiol Hemihydrate 25 mcg/24h

Patch: Estradiol Hemihydrate 50 mcg/24h

Patch: Estradiol Hemihydrate 100 mcg/24h

Vaginal Tablets: 0.25 mcg

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

واژینیت آتروفیک؛ دیستروپی آتروفیک ولو؛ علائم منوپوز؛ هیپوگوناדיسم؛ اواریکتومی؛

نارسایی اولیه تخمدان

– سرطان پروستات غیر قابل جراحی

– سرطان پستان غیر قابل جراحی

– بزرگ شدن پستان بعد از زایمان

☞ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: • ترومبوفلیت • ترومبوآمبولی • سرطانهای وابسته به استروژن (پستان و دستگاه تناسلی)
• خونریزی ژنیتال غیرطبیعی تشخیص داده نشده • دوران حاملگی • دوران شیردهی.
موارد احتیاط: • آسم • تشنج • میگرن • اختلال عملکرد قلب، کلیه و کبد • بیماری فیبروکیستیک پ
• تاریخچه خانوادگی سرطان پستان.

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ به منظور پیشگیری از تهوع بهتر است دارو را همراه یا بلافاصله بعد از غذا تجویز نمائید.
- ✓ دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و رطوبت و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمائید.
- پیگیری و بررسی تأثیر دارو:**
- ✓ تهوع بخصوص در هنگام صبح معمولاً ۲-۱ هفته بعد از شروع درمان برطرف می شود.

- در بیماران مبتلا به سرطان پستان و متاستاز استخوانی ممکن است بدنال تجویز این دارو هیپرکلسمی شدید ($15 > \text{mg/dl}$) رخ دهد.
- ✓ درمان با استروژنها باید حداقل چهار هفته قبل از انجام اعمال جراحی که همراه با بی حرکتی طولانی مدت هستند، قطع شود.

آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی:** ☑ به بیمار بیاموزید دارو را مطابق دستور بکار برده و دوز فراموش شده را به محض بخاطر آوردن مصرف نماید، البته نه درست قبل از دوز بعدی و همچنین باید از دو برابر نمودن دوزهای دارو اجتناب شود.
- ☑ به بیمار توضیح دهید در صورت شدت یافتن یا مشکل آفرینی تهوع، مصرف غذاهای خشک و جامد مؤثر است.
- ☑ به بیمار توصیه نمائید در صورت بروز علائم و نشانه های احتباس مایعات (تورم قوزک پا و یا افزایش وزن)، اختلالات ترومبوآمبولیک (درد، تورم و حساسیت در اندامها؛ سردرد؛ درد قفسه سینه؛ اختلال بینایی)، دپرسیون مغزی یا اختلال کبدی (زردی پوست یا چشم، خارش، تیرگی رنگ ادرار، بی رنگ شدن مدفوع) به پزشک اطلاع دهد.
- ☑ به بیمار بیاموزید در صورت شک به بارداری، مصرف دارو را متوقف نموده و به پزشک اطلاع دهد.
- ☑ به بیمار توضیح دهید مصرف سیگار در طی درمان با این دارو باعث افزایش خطر بروز عوارض جانبی جدی آن خصوصاً در خانمهای بالای ۳۵ سال می گردد.
- ☑ بر اهمیت انجام معاینات فیزیکی پیگیر نظیر کنترل فشارخون، معاینه پستان، شکم، لگن و پاپ اسمیر هر ۱۲-۶ ماه تأکید نمائید.

مصرف در دوران شیردهی

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

SPECTINOMYCIN (as 2HCl) h
Spectocin, Trobicin

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : آمینو سیکلیتول

• طبقه‌بندی درمانی : آنتی‌بیوتیک

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه B

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

For Injection: Spectinomycin 2 g/Vial

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

- گونوره بدون عارضه

- گونوره منتشر

☞ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط نسبت به این دارو.
موارد احتیاط: ○ سابقه آلرژی دارویی.

تجویز و نگهداری دارو:

✓ در صورت تزریق عضلانی نباید بیش از 5ml از دارو را در هر سمت تزریق نمود. تزریق ممکن است دردناک باشد.
✓ دارو را در درجه حرارت 15-30°C نگهداری کنید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار تأکید کنید تا کسب اطمینان از برطرف شدن عفونت یا انجام تست‌های مکرر از تماس جنسی پرهیز نماید. لباسهای زیر، حوله یا وسایل استحمام بیمار نباید با دیگران مشترک باشد. با بیمار درمورد اهمیت روابط جنسی سالم در پیشگیری از عفونت صحبت نمایید.

☒ به بیمار توضیح دهید که ممکن است پس از مصرف دارو دچار تهوع، تب، لرز، گیجی و بی‌خوابی گردیده و زخم موقتی در محل تزریق ایجاد شود.

☒ بر ضرورت انجام کشت و آنتی‌بیوگرام، یک هفته پس از درمان جهت کسب اطمینان از تأثیر دارو تأکید نمایید.

☞ مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است. با این وجود بدلیل احتمال ایجاد عوارض جانبی در شیرخوار، مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

OLANZAPINE h
Zyprexa, Zyprobiox

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مشتقات تینوبزودیازپین

• طبقه‌بندی درمانی : ضدسایکوز

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 2.5 mg

Tablets: 5 mg

Tablets: 10 mg

Tablets: 15 mg

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

درمان تظاهرات اختلالات سایکوتیک

☞ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط نسبت به دارو.
موارد احتیاط: ○ بیماری قلبی ○ بیماری عروق مغز ○ بیماران مستعد هیپوتانسیون ○ سابقه تشنج ○ اختلال عد کبد ○ افراد مسن ○ سابقه ایلئوس پارالیتیک ○ هیپرتروفی پروستات ○ گلوکوم زاویه باریک ○ بیماران در معرض پنومونی ناشی از اسپیراسیون.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را در ظروف مقاوم به نور و رطوبت و درجه حرارت $2-25^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمائید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☑ از بیمار بخواهید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☑ به بیمار تذکر دهید در محل‌های خیلی گرم قرار نگیرد.

☑ به بیمار تذکر دهید به منظور کاهش بروز هیپوتانسیون ارتواستاتیک از تغییر وضعیت ناگهانی خودداری نماید.

☑ از بیمار بخواهید قبل از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت نماید.

☑ راههای مقابله با خشکی دهان را به بیمار آموزش دهید.

☞ مصرف در دوران شیردهی

تغذیه کودک با شیر مادر در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

ACETAZOLAMIDE h

Ak-Zol, Diamox, Diamox Sequels

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مهارکننده آنزیم کربنیک انهدراز

• طبقه‌بندی درمانی : درمان کمکی در گلوکوم زاویه باز و درمان قبل از جراحی گلوکوم حاد زاویه بسته، ضد تشنج، درمان ادم، پیشگیری و درمان موارد حاد بیماری ارتفاع

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 250 mg

For Injection: Acetazolamide 500 mg/Vial (as Sodium Salt)

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

درمان قبل از جراحی گلوکوم حاد زاویه بسته
گلوکوم زاویه باز مزمن

گلوکوم شدید

ادم ناشی از داروها

درمان ادم در نارسایی احتقانی قلب

پیشگیری و درمان موارد حاد بیماری ارتفاع

تشنج میوکلونیک، مرحله جبرانی تشنج جنرالیزه تونیک - کلونیک (گراندمال) یا آبسنس (پتی‌مال)، تشنج مخلوط

فلج‌های پریودیک

(*) جلوگیری از نفرولیتiaz اسید اوریک یا سیستینی

(*) دیورز و قلیایی کردن در درمان مسمومیت با داروهای اسیدی ضعیف

کاهش فشار داخل چشمی در گلوکوم‌های ثانویه

☞ کنترااندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنترااندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط نسبت به استازولامید ● نارسایی کبدی ● اسیدوز هیپرکلرمیک ● در بیماران غلظت پائین سدیم و پتاسیم ● اختلال شدید کلیوی.

موارد احتیاط: ○ بیماری‌های مزمن تنفسی ○ اسیدوز تنفسی ○ دیابت ملیتوس ○ مصرف همزمان با گلیکوزیدهای ○ مصرف همزمان با دیورتیک‌ها ○ حاملگی و شیردهی ○ سابقه هیپرکلسمیوری.

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ جهت کاهش عوارض گوارشی، دارو را می‌توان به همراه غذا مصرف نمود.
- ✓ جهت جلوگیری از بیدار شدن بیمار در هنگام شب، دوز دیورتیک را صبح‌ها تجویز نمایید.
- ✓ توصیه می‌شود، ویال 500mg استازولامید حداقل بوسیله 5ml آب استریل برای تزریق، حل شود.
- ✓ دوز دیورتیک صبح‌ها مصرف شود تا بیمار شب‌ها راحت بخوابد.
- ✓ این دارو را می‌توان با محلول‌های رینگر لاکتات، DW5%، DW10%، کلرید سدیم 0.45%، کلرید سدیم 0.9% و رینگر لاکتات رقیق نموده و در خلال ۸-۴ ساعت انفوزیون نمود.
- ✓ داروی رقیق شده باید در طی ۲۴ ساعت مصرف شود.
- ✓ در صورت نیاز به تزریق دارو، تزریق مستقیم وریدی ارجح است.
- ✓ فرآورده‌های خوراکی دارو را باید در درجه حرارت 15-30°C نگهداری نمود.

آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☐ بیمار باید بروز علایمی چون بی‌حسی یا گزگز شدن انتهایها، ضعف، راش، گلودرد، خونریزی غیرعادی تب را به پزشک گزارش دهد.
- ☐ مصرف استازولامید گهگاه سبب خواب‌آلودگی می‌شود. بیمار باید از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- فشار داخل چشم: ☐ چون گلوکوم مزمن زاویه باز، بدون درد می‌باشد و نابینایی تدریجاً بروز می‌نماید، انجام آزمونهای دوره‌ای چشم برای بیمار ضروری است.

مصرف در دوران شیردهی

بدون ضرر بودن مصرف استازولامید در دوران شیردهی، هنوز مشخص نیست.

SPIRONOLACTONE

Aldactone

● طبقه‌بندی فارماکولوژیک : دیورتیک نگهدارنده پتاسیم

● طبقه‌بندی درمانی : درمان ادم، ضدهیپرتانسیون، تشخیص هیپرآلدوسترونیسم اولیه، درمان هیپوکالمی ناشی از مصرف دیورتیکها

● طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C (در حاملگی منجر به هیپرتانسیون D)

● فرآورده‌های ژنریک ایران

Film Coated Tablets: 25 mg

Scored Film Coated Tablets: 100 mg

● اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

ادم

✖ تشخیص هیپرآلدوسترونیسم اولیه

هیپرسوتیسم

هیپوکالمی ناشی از دیورتیک‌ها

هیپرتانسیون

نارسایی قلبی در بیمارانی که مهارکننده ACE و یک دیورتیک لوپ ه همراه با یا بدون

گلیکوزید قلبی دریافت می‌کنند

✖ کاهش خطر منوراژی

✖ آکنه و لگاریس

● کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

- کنتراندیکاسیون‌ها: ● پتاسیم سرم بالاتر از 5.5mEq/Lit ● مصرف همزمان سایر دیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم ● آنوری ● نارسایی حاد و مزمن کلیه ● نوروپاتی دیابتیک ● حساسیت مفرط نسبت به دارو.
- موارد احتیاط: ○ نارسایی شری کبدی ○ دیابت.

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ دارو را همراه با غذا تجویز نمائید.
- ✓ دارو را می‌توان قبل از تجویز خرد و همراه با آب یا سایر مایعات تجویز نمود.
- ✓ دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور نگهداری کنید.
- الکترولیت‌های سرم را بخصوص در مراحل اولیه درمان کنترل کنید.
- ✓ میزان I&O بیمار را هر روز کنترل و بیمار را از نظر وجود ادم بررسی کنید. ایجاد یا افزایش ادم، بیانگر تolerانس نسبت به دارو است.
- ✓ بیمار را قبل از شروع درمان و سپس در فواصل منظم، تحت شرایط استاندارد وزن کنید.
- ✓ در بیماران دچار بیماری کبدی، وضعیت مغزی را از نظر بروز لتارژی و یا استوپور بررسی نمائید.
- ✓ اغلب عوارض جانبی معمولاً بعد از قطع دارو برطرف می‌شوند. بروز ژنیکوماستی به دوز دارو و مدت زمان درمان بستگی دارد و ممکن است تا مدتی بعد از قطع دارو باقی بماند.

آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☐ بر اهمیت تداوم مصرف دارو علیرغم احساس بهبودی تأکید نموده و به بیمار بیاموزید دارو را هر روز د زمان معینی بکار برده و در صورت فراموش کردن یک نوبت بلافاصله پس از بخاطر آوردن به مصرف برساند. مگر اینکه تقریباً فرصتی تا زمان نوبت بعدی دارو وجود نداشته باشد.
- ☐ به بیمار تذکر دهید بدون مشورت با پزشک از مصرف نمکهای جایگزین نمک طعام و غذاهای غنی از سدیم و پتاسیم پرهیز نماید.
- ☐ مصرف اسپرونولاکتون سبب سرگیجه می‌شوند لذا به بیمار توصیه کنید تا مشخص نشدن اثر درمان از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ☐ به بیمار توصیه نمائید که بروز کرامپ و ضعف عضلانی، خستگی، تهوع شدید، استفراغ یا اسهال را به پزشک گزارش نماید.

مصرف در دوران شیردهی

بی‌ضرر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است. تغذیه با شیر، در حین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

ISOSORBIDE Dinitrate h

Dilatrate-SR, Iso-bid, Isochron, Isonate TR, Isordil, Isotrate, Sorate, Sorbide TD, Sorbitrate, Sorbitrate SA

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : نیترات

• طبقه‌بندی درمانی : ضد آنژین، گشادکننده عروق

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

📌 فرآورده‌های ژنریک ایران

Sublingual Tablets: 5 mg

Tablets: 10 mg

Sustained Release Tablets: 40 mg

📌 اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

درمان و یا پروفیلاکسی از حمله حاد آنژین صدری؛ درمان بیماری ایسکمیک مزمن قلب (از

طریق کاهش preload)

✖ درمان کمکی در نارسایی احتقانی قلب (CHF)

✖ اسپاسم منتشر مری بدون ریفلکس گاستروازوفژیال

📌 کنترل اندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط ● آنمی شدید.
موارد احتیاط: ○ افزایش فشار داخل جمجمه ○ تروما به سر ○ گلوکوم زاویه باز یا بسته ○ پائین بودن فشار سیستولیک (کمتر از 90mmHg) ○ در خلال روزهای اول بعد از MI.

📌 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ دارو را بهتر است با معده خالی (یک ساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا) تجویز نمود. در صورت ایجاد سردرد عروقی در بیمار می‌توان دارو را همراه با غذا تجویز نمود.
- ✓ در هنگام استفاده از قرص زیرزبانی، جهت جلوگیری از هیپوتانسیون ارتوستاتیک، بیمار باید نشسته باشد.
- ✓ دارو را باید در ظروف دربسته و در محل خنک، خشک و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری کرد.

آموزش بیمار / خانواده

بزرگوار

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار بیاموزید علیرغم احساس بهبودی دارو را کاملاً مطابق با دستور مصرف نماید و نوبت فراموش شده را بلافاصله پس از بخاطر آوردن مصرف نماید. مگر اینکه تناوب مصرف دارو هر ۲ ساعت یکبار باشد (در ترکیبات دیر آزادشونده هر ۶ ساعت یکبار). همچنین توصیه نمائید از دو برابر نمودن یا قطع ناگهانی دارو پرهیز نماید.

☒ وقتی از دارو جهت درمان حملات آنژیینی استفاده می شود، به بیمار توصیه نمائید در وضعیت نشسته قرار گرفته، پس از بروز اولین علامت حمله، دارو را مصرف نماید. درد بیمار معمولاً پس از ۵ دقیقه تسکین خواهد یافت. در صورت عدم بهبود درد، می تواند دوز دارو را ۱۰-۵ دقیقه بعد تکرار نموده و در صورتی که پس از مصرف ۳ قرص ظرف ۱۵

دقیقه دردش برطرف نشد، به پزشک اطلاع داده و یا به اورژانس مراجعه نماید. برای درمان حملات آنژیینی فقط باید از قرصهای زیرزبانی و جویدنی استفاده نمود.

☒ به بیمار توصیه نمائید که سردرد، عارضه جانبی معمول و شایع این دارو است که با تداوم درمان برطرف خواهد شد. برای درمان سردرد می تواند طبق دستور پزشک از اسپیرین یا استامینوفن استفاده نماید. در صورت مقاومت درد در برابر درمان یا تشدید آن، باید پزشک را مطلع سازد.

مصرف در دوران شیردهی

اگرچه ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است؛ با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.

OFLOXACIN (Systemic) h
Floxin, Loflox, Ofloxacin-Exir

- طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مشتقات کینولون‌ها
- طبقه‌بندی درمانی : آنتی‌بیوتیک
- طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Film Coated Tablets: 200 mg

Film Coated Tablets: 300 mg

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

عفونت‌های خفیف تا متوسط دستگاه ادراری ناشی از میکرو ارگانیسم‌های حساس
اسهال عفونی، عفونتهای تنفسی خفیف تا متوسط، عفونت‌های استخوان و مفاصل، عفونت‌های
شدید دستگاه ادراری

☞ کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط نسبت به کینولون‌ها ● کودکان.
موارد احتیاط: ○ اختلالات دستگاه عصبی مرکزی ○ اپی‌لپسی ○ آرتریواسکلروز عروق مغزی.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ افلوکساسین خوراکی را نباید همراه با غذا تجویز کرد.
- ✓ حداقل دو ساعت قبل و دو ساعت بعد از تجویز افلوکساسین از تجویز مکمل‌های معدنی و ویتامین‌های حاوی آهن یا روی خودداری کنید.
- ✓ حداقل ۴ ساعت قبل و یا دو ساعت بعد از تجویز افلوکساسین از مصرف آنتی‌اسیدهای حاوی منیزیم، آلومینیوم و یا سوکرافات خودداری نمایید.
- ✓ دارو را در ظروف دربسته و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری کنید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

- ☐ اطلاعات کلی: بیمار را به مصرف مایعات فراوان تشویق نمایید.
- ☐ مصرف این دارو سبب خواب‌آلودگی می‌گردد. به بیمار توصیه نمایید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ☐ به بیمار توصیه نمایید از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کند.

☞ مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر ترشح می‌شود. بدلیل احتمال ایجاد عوارض جانبی خطرناک در شیرخوار، تغذیه با شیرمادر در حین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

ONDANSETRON (as HCl) h

Zofran

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنتاگونیست گیرندهٔ سروتونین

• طبقه‌بندی درمانی: ضد استفراغ

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه B

❖ فرآورده‌های ژنریک ایران

Film Coated Tablets: 4 mg

Oral Solution: 4 mg/5 ml

Injection: 2 mg/ml (2 ml, 4 ml)

❖ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از شروع و یا تکرار دوره‌های شیمی‌درمانی، بخصوص همراه با سیس‌پلاتین

پیشگیری از بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل
پیشگیری از بروز تهوع و استفراغ ناشی از رادیاسیون

❖ کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

● حساسیت مفرط نسبت به دارو.

موارد احتیاط: ○ نارسایی کبد.

❖ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را نیم ساعت قبل از شیمی‌درمانی و ۱-۲ ساعت بعد از رادیاسیون تجویز نمائید.

✓ دوزهای وریدی دارو باید در خلال ۱۵ دقیقه تجویز شوند.

✓ دارو را در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمائید. محلول رقیق شدهٔ دارو را در درجه حرارت اتاق می‌توان تا ۴۸ ساعت نگهداری نمود.

❖ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ سردرد از عوارض شایع این دارو است. به بیمار آموزش دهید در صورت بروز این عارضه از داروها مسکن استفاده نماید.

❖ مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است. تجویز این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.

BIPERIDEN h
Akineton

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : آنتی‌کولینرژیک

• طبقه‌بندی درمانی : ضد پارکینسونیسم

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

📌 **فرآورده‌های ژنریک ایران**

Tablets: Biperiden HCl 2 mg

Coated Tablets: Biperiden HCl SR 4 mg

Injection: Biperiden Lactate 5 mg/ml

📌 **اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ**

اختلالات اکستراپیرامیدال

📌 **کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط**

کنتراندیکاسیونها: ● هیپرتروفی خوش خیم پروستات ● دیس‌ریتمی‌های قلبی ● گلوکوم زاویه باریک ● مگاکولون

📌 **توجهات بالینی**

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ جهت کاهش تحریک دستگاه گوارش بهتر است دارو را همراه و یا بعد از غذا مصرف نمود.
- ✓ محلول تزریقی دارو را می‌توان بدون رقیق کردن به صورت وریدی تزریق نمود.
- ✓ دارو را باید در ظروف در بسته و مقاوم در برابر نور و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمود.
- پیگیری و بررسی تأثیر دارو:**
- ✓ بعد از تزریق وریدی باید فشارخون و نبض بیمار را کنترل نمود. تزریق وریدی باید به آهستگی انجام شود.
- ✓ میزان I&O (دریافتی و دفع) بیمار را کنترل نمایید و در صورت بروز یبوست، میزان فیبر مصرفی روزانه و مایعات دریافتی بیمار را افزایش دهید.
- ✓ در صورتی که به دنبال مصرف درازمدت، نسبت به این دارو تحمل ایجاد شود، بایستی دوز دارو را افزایش داد.

📌 **آموزش بیمار / خانواده**

- اطلاعات کلی: ☑ مصرف این دارو احتمالاً باعث بروز خواب‌آلودگی، سرگیجه یا تاری دید خواهد شد؛ به بیمار توصیه نمایید تا مشخص نشدن تأثیر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ☑ به بیمار گوشزد نمایید، جهت پیشگیری از بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک از تغییر ناگهانی وضعیت پرهیز نماید.
- ☑ مصرف این دارو باعث کاهش تعریق می‌گردد و قرار گرفتن در هوای گرم ممکن است باعث افزایش شدید درجه حرارت بدن بیمار گردد.
- ☑ به بیمار توصیه نمایید در صورتی که نتواند هوای اتاق را علیرغم وجود تهویه تحمل نماید به پزشک خود اطلاع دهد.
- خوراکی: ☑ لازم است بیمار جهت به حداقل رساندن تحریک معده دارو را همراه با غذا یا بلافاصله پس از آن مصرف نماید.

📌 **مصرف در دوران شیردهی**

بی‌پریدین ممکن است در شیر مادر ترشح شود و احتمالاً باعث مسمومیت در شیرخوار می‌گردد. این دارو همچنین تولید

شیر مادر را کاهش می‌دهد. زنان در دوران شیردهی باید از مصرف این دارو اجتناب نمایند.

BROMOCRIPTINE (as Mesylate) h

Minobromocriptine, Paridel

- طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنتاگونیست گیرنده دوپامین، آکالوئید ارگوت نیمه‌صناعی
- طبقه‌بندی درمانی: آگونیست دوپامینرژیک، ضدپارکینسونیسم، مهارکننده ترشح پرولاکتین، مهارکننده ترشح هورمون رشد
- طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Scored Tablets: Bromocriptine 2.5 mg

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

آمنوره و گالاکتوره ناشی از هیپرپرولاکتینمی؛ نازایی در زنان

جلوگیری از ترشح فیزیولوژیک شیر بعد از زایمان

آکرومگالی

بیماری پارکینسون

سندرم پیش قاعدگی (PMS)

سندرم کوشینگ

آنسفالوپاتی کبدی

سندرم نورولپتیک بدخیم مرتبط با دارودرمانی نورولپتیک

☞ کنترل اندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

- کنترل اندیکاسیون‌ها: ● بیماران حساس به اکالوئیدهای ارگو ● بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک شدید قلب
- بیماری‌های عروق محیطی ● زنان شیرده (این دارو ترشح شیر را مهار می‌نماید).
- موارد احتیاط: ○ بیماری رینود ○ بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کبدی یا کلیوی ○ بیماران مبتلا به اختلال سایکوتیک ○ بیماران با سابقه آنفارکتوس میوکارد همراه با دیس‌ریتمی‌های باقیمانده.

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ جهت کاهش تحریک دستگاه گوارش دارو را باید همراه غذا یا شیر مصرف نمود.
- ✓ بدلیل اثر مهاری دارو برروی ترشح شیر، بهتر است این دارو حداقل ۴ هفته بعد از زایمان مصرف شود.
- ✓ دارو را باید در ظروف در بسته مقاوم به نور و درجه حرارت $2-25^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمود.

- در خلال روزهای اول تجویز دارو فشارخون بیمار باید به طور منظم اندازه گیری گردد.
- ✓ عواض جانبی ناشی از این دارو شایع هستند ولی معمولاً با کاهش دوز دارو برطرف می شوند.
- ✓ در صورت درمان درازمدت باید عملکرد کبد، دستگاه قلب و عروق، کلیه و سیستم خونی بیمار کنترل شود.
- ✓ بدلیل نیاز به دوزهای بالای دارو در درمان بیماری پارکینسون احتمال مسمومیت با دارو در این بیماران بیشتر است.
- ✓ احتمال عود آمنوره و گالاکتوره بدنبال قطع مصرف دارو زیاد است. آمنوره اغلب در خلال ۲۴-۴ هفته و گالاکتوره در خلال ۱۲-۲ هفته بعد از قطع دارو عود می کند.

آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☐ مصرف این دارو باعث سرگیجه و خواب آلودگی می گردد به بیمار توصیه کنید تا مشخص نشدن اثرات دارو از رانندگی یا سایر امور نیازمند هشیاری بپرهیزد.
- ☐ به بیمار توصیه کنید در ارتباط با شیوه های غیرهورمونی پیشگیری از بارداری با پزشک مشورت نماید و در صورت شک به بارداری سریعاً به پزشک اطلاع دهد.

مصرف در دوران شیردهی

این دارو باعث مهار ترشح شیر می گردد و نباید در مادرانی که به کودکان خود شیر می دهند، مصرف شود.

BISMUTH SUBCITRATE (BISMUTH OXIDE) h

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : ترکیبات بیسموت

• طبقه‌بندی درمانی : ضد زخم پپتیک

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C (در خلال سه ماهه سوم حاملگی: گروه D)

• فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 120 mg

• اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

درمان زخم پپتیک

• مصرف در دوران شیردهی

مقادیر ناچیزی از بیسموت در شیر ترشح می‌شود. منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.

BETAHISTINE 2HCl h
Bestin, Betaserc, Vertilox

- طبقه‌بندی فارماکولوژیک : آنالوگ هیستامین
- طبقه‌بندی درمانی : ضد سرگیجه در بیماری منییر (Meniere)
- طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 8 mg

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوز
کاهش علائم بیماری منییر

☞ کنترل اندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیون‌ها: ● فئوکروموسیتوما.
موارد احتیاط: ○ آسم ○ سابقه زخم پپتیک ○ حاملگی ○ دوران شیردهی.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ به منظور کاهش تحریک دستگاه گوارش بهتر است دارو را همراه با غذا و با یک لیوان آب تجویز نمود.
- ✓ دارو را در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمایید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ بیمار باید در خلال درمان با این دارو، از اقدام جهت حاملگی خودداری نماید.

☞ مصرف در دوران شیردهی

بی‌خطر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی اثبات نشده است؛ تغذیه با شیر مادر در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

PERMETHRIN (Topical) h

Nix

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ترکیب پیرتروئید صنعتی

• طبقه‌بندی درمانی: شپش‌کش

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه B

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Cream Rinse: 1% W/W

Shampoo: 1%

Cream: 5%

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

درمان شپش سر

بالغین و کودکان: به مقدار کافی از دارو روی سر و موها مالیده و پس از ۱۰ دقیقه شسته می‌شود.

درمال گال

بالغین و کودکان: به مقدار کافی از دارو بر روی پوست مالیده و بعد از ۱۴-۱۰ ساعت شسته می‌شود.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را در درجه حرارت 15-25°C نگهداری کنید. از یخ زدن دارو جلوگیری کنید.

پیگیری و بررسی تأثیر دارو:

✓ در صورت بروز حساسیت، مصرف دارو را قطع کنید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

به بیمار توصیه نمائید قبل از مصرف دارو موهای سر خود را خشک نمایید.

☞ مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است. با این حال مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.

TRETINOIN h
Comex, Retin-A

- طبقه‌بندی فارماکولوژیک : اسید رتینوئیک
- طبقه‌بندی درمانی : ضد آکنه
- طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Topical Cream: 0.05%

Lotion: 0.05%

Topical Gel: 0.025%

Topical Gel: 0.05%

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ
آکنه و لگاریس

☞ کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط
کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط.
موارد احتیاط: ○ آگزما.

☞ توجهات بالینی

- ✓ قبل از تجویز دارو، پوست منطقه مبتلا را با صابون ضعیف کاملاً شسته و خشک نمائید.
- ✓ دست‌های خود را قبل و بعد از تجویز دارو، کاملاً بشوئید.
- ✓ از تماس دارو با چشم، دهان، کناره‌های بینی، زخم‌های باز و سایر سطوح مخاطی خودداری نمائید.
- ✓ دارو را در درجه حرارت کمتر از C30 نگهداری کنید.
- پیگیری و بررسی تأثیر دارو:
- ✓ پاسخ درمانی به دارو، ظرف ۲-۳ هفته ایجاد می‌شود ولی پاسخ کامل معمولاً ۳-۴ ماه بطول می‌انجامد.

☞ آموزش بیمار / خانواده

- ☒ موضعی: برای بیمار توضیح دهید مصرف دارو ابتدا ممکن است ظاهر آکنه را بدتر کند، با این وجود بیمار نباید مصرف دارو را قطع نماید، مگر آنکه تحریک یا سایر نشانه‌های عارضه تشدید شود.
- ☒ به بیمار بیاموزید در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش نمود از مصرف آن خودداری نموده و درمان را طبق برنامه ادامه دهد.

☞ مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر ثابت نشده، با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.

TRANEXAMIC ACID h

Cyklokapron, Trancid, Tranexip, Transamin

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : ضد فیبرینولیز

• طبقه‌بندی درمانی : بندآورنده خون

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه B

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Capsules: 250 mg

Scored Tablets: 500 mg

Injection: 50 mg/ml (5 ml)

Injection: 100 mg/ml (5, 10 ml)

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

جراحی مثانه و برداشت مثانه

منوراژی

خونریزی از بینی

خونریزی اتاقک چشم ناشی از ضربه

جلوگیری از خونریزی به هنگام کشیدن دندان در بیماران مبتلا به هموفیلی

کهیر غول‌آسای ارثی

فیبرینولیز منتشر

☞ کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● اختلالات ترومبوآمبولیک.

موارد احتیاط: ○ اختلال عملکرد کلیه ○ خونریزی شدید از قسمت فوقانی دستگاه ادراری.

☞ مصرف در دوران شیردهی

عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده است.

CETIRIZINE 2HCl h

Reactine, Zyrtec

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنتاگونیست انتخابی گیرنده H₁

• طبقه‌بندی درمانی: آنتی‌هیستامین

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه B

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Film Coated Tablets: 5 mg

Film Coated Tablets: 10 mg

Syrup: 5 mg/5 ml (60 ml)

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

رینیت آلرژیک فصلی؛ رینیت آلرژیک پایدار؛ کهیر مزمن

دوزاژ در نارسایی کلیه و کبد

☞ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط نسبت به دارو و هیدروکسی‌زین.
موارد احتیاط: ○ اختلال عملکرد کلیه.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ متابولیسم این دارو در افراد مسن به‌کندی صورت می‌گیرد. دوز دارو را باید در این افراد کاهش داد.
✓ دارو را در درجه حرارت 15-30°C نگهداری نمایید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار توصیه نمائید تا مشخص نشدن اثرات دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☞ مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر ترشح می‌شود. از تجویز این دارو در دوران شیردهی خودداری نمائید.

CYPROHEPTADINE HCl

Cypractin, Periaction

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنتاگونیست گیرنده H_1

• طبقه‌بندی درمانی: آنتی‌هیستامین، ضدخارش

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه B

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Scored Tablets: 4 mg

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

علائم آلرژی؛ خارش؛ کهیر؛ کونژکتیویت آلرژیک؛ محرک اشتها؛ سردردهای کلاستر عروقی
✱ سندرم کوشینگ

☞ کنترل اندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیون‌ها: ● حساسیت شناخته شده نسبت به این دارو و سایر داروهای آنتی‌هیستامین با ساختمان شیمیایی مشابه ● حملات آسم ● مصرف مهارکننده‌های منوآمین اکسیداز در طی دو هفته اخیر.
موارد احتیاط: ○ گلوکوم زاویه باریک ○ انسداد پیلودونال ○ انسداد خروجی مثانه ناشی از بزرگی پروستات و یا تنگ گردن مثانه ○ بیماری‌های قلبی عروقی ○ هیپرتانسیون ○ هیپرتیروئیدیسم ○ بیماری کلیوی ○ دیابت ○ آسم برونکیال ○ احتباس ادراری ○ زخمهای پپتیک همراه با استنوز ○ حاملگی به‌خصوص سه ماهه سوم ○ دوران شیردهی.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ جهت کاهش تحریک دستگاه گوارش دارو را همراه با غذا تجویز نمائید.
✓ دارو را در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمائید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار توصیه نمائید دوز فراموش شده را بلافاصله پس از به‌خاطر آوردن مصرف نماید، همچنین دوبرابر نمودن دوزهای دارو پرهیز نماید.
☒ مصرف این دارو باعث خواب‌آلودگی می‌گردد. به بیمار توصیه نمائید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
☒ به بیمار تذکر دهید از مصرف سایر داروهای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی پرهیزد.

☞ مصرف در دوران شیردهی

سیپروهپتادین نباید در دوران شیردهی تجویز شوند.

SULFASALAZINE

Azaline, Azalin EC, Azulfidine, S.A.S. 500, Salazopyrine

● طبقه‌بندی فارماکولوژیک : سولفونامید

● طبقه‌بندی درمانی : آنتی‌بیوتیک

● طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه B (در زمان ترم: گروه D)

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Enteric Coated Tablets: 500 mg

Enema: 3 g/100 ml

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوز

کولیت اولسراتیو خفیف تا متوسط؛ درمان کمکی در کولیت اولسراتیو شدید

☞ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط نسبت به سولفونامیدها و یا سایر داروهای حاوی سولفور (تیازیدها، فورسمای ترکیبات سولفونیل‌اوره خوراکی) ● حساسیت شناخته شده به سالیسیلاتها ● اختلال عملکرد شدید کلیه یا کبد ● پورفیری ● حاملگی (در زمان ترم) ● دوران شیردهی ● شیرخواران و کودکان زیر ۲ ماه ● انسداد روده و یا دستگاه ادراری. موارد احتیاط: ○ اختلال خفیف تا متوسط عملکرد کلیه یا کبد ○ آلرژیهای شدید ○ آسم ○ دیس‌کرازیمهای خونی ○ کمبود آنزیم گلوکز - ۶ - فسفات دهیدروژناز (G6PD).

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ در صورت امکان دارو را بعد از غذا تجویز نمائید.
✓ دارو را در ظروف دربسته و درجه حرارت 15-30°C نگهداری کنید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار پیاموزید علیرغم احساس بهبودی درمان را طبق تجویز ادامه دهد و در صورت فراموش شدن یک دوز بلافاصله پس از بخاطر آوردن آن را مصرف نماید، مگر اینکه فرصتی تا زمان دوز بعدی وجود نداشته باشد.

☒ مصرف این دارو باعث سرگیجه می‌گردد، به همین جهت به بیمار توصیه نمائید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☒ به بیمار توضیح دهید که مصرف این دارو باعث تغییر رنگ ادرار و پوست به پرتقالی متمایل به زرد می‌شود که جای نگرانی نیست.

☒ به بیمار پیاموزید بروز راش، گلودرد، تب، زخم دهان یا خونریزی و کبودشدگی غیرمعمول پوست را به پزشک گزارش نماید.

☒ به بیمار توضیح دهید در صورت عدم بهبود علائم ۱-۲ ماه پس از شروع درمان، پزشک را مطلع سازد.

☞ مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر ترشح می‌شود و نباید در دوران شیردهی تجویز شود.

SUCRALFATE h
Carafate

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مهارکنندهٔ پپسین

• طبقه‌بندی درمانی : ضد زخم پپتیک

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه B

📌 فرآورده‌های ژنریک ایران

Scored Tablets: 500 mg

Scored Tablets: 1 g

For Oral Suspension: 1 g/Sachet

📌 اندیکاسیونها، راه مصرف و دوز

درمان کوتاه‌مدت (حداکثر تا ۸ هفته) زخم دئودنوم

درمان نگهدارنده زخم دئودنوم

📌 کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: ● حساسیت به سوکرافیت.

📌 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ در صورت نیاز به تجویز همزمان داروهای آنتی‌اسید، این داروها را نیم‌ساعت قبل و یا بعد از تجویز سوکرافیت تجویز کنید.
✓ دارو را در ظروف دربسته و درجه حرارت اتاق نگهداری نمایید.

📌 آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☐ به بیمار توصیه کنید علیرغم احساس بهبودی، برای اطمینان از بهبود کامل زخم، درمان را به مدت ۴-۸ هفته ادامه دهد و در صورت فراموش نمودن یک دوز از دارو، بلافاصله پس از بخاطر آوردن آن را مصرف نماید، مگر اینکه فاصله‌ای تا زمان مصرف نوبت بعدی وجود نداشته باشد. بیمار باید از دوبرابر کردن دوز دارو پرهیز نماید.

☐ به بیمار توصیه کنید به منظور پیشگیری از ایجاد یبوست ناشی از مصرف دارو، بر میزان مایعات و مواد حجیم موجود در رژیم غذایی‌اش افزوده و سطح فعالیت روزانه‌اش را بالا ببرد.

☐ برای بیمار توضیح دهید که قطع مصرف سیگار می‌تواند در پیشگیری از برگشت زخم دئودنوم مؤثر باشد.

📌 مصرف در دوران شیردهی

منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن در نظر گرفته شود.

CINNARIZINE h

Cinazin, Stugeron, Stugeron Forte

● طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مشتقات پی‌پرازین

● طبقه‌بندی درمانی : ضدتهوع و سرگیجه (در بیماری منییر)، گشادکننده عروق محیطی

● طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 25 mg

Tablets: 75 mg

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

درمان علامتی تهوع و سرگیجه ناشی از بیماری منییر و اختلالات وستیبولار
بیماری حرکت (motion sickness)
اختلالات عروقی مغز و عروق محیطی

☞ کنترااندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنترااندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط به دارو ● پورفیری ● مصرف همزمان با داروهای مهارکننده متوآمین اکسیداز.
موارد احتیاط: ○ هیپرتروفی خوش‌خیم پروستات و احتباس ادراری ○ صرع و سابقه تشنج ○ انسداد دستگاه گوا
○ گلوکوم زاویه بسته ○ دوران حاملگی ○ دوران شیردهی.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ بهتر است دارو را همراه با غذا تجویز نمود.

✓ دارو را در درجه حرارت 15-30°C نگهداری نمایید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار تذکر دهید در خلال درمان با این دارو از مصرف سایر داروهای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی پرهیز نماید.

☞ مصرف در دوران شیردهی

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

CITALOPRAM Hydrobromide h

Bioxal, Celexa, Citalex

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مهارکننده بازجذب سروتونین

• طبقه‌بندی درمانی : ضدافسردگی

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Film Coated Tablets: 20 mg

Film Coated Tablets: 40 mg

Oral Drops: 40 mg/ml

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

افسردگی ماژور

☞ کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط به دارو.
موارد احتیاط: ○ حاملگی ○ دوران شیردهی ○ کودکان ○ افراد مسن.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ بمنظور کاهش تحریک دستگاه گوارش، دارو را همراه غذا یا شیر تجویز نمائید.
- ✓ در صورت بروز خواب‌آلودگی، دارو را بصورت دوز واحد و به هنگام خواب تجویز کنید.
- ✓ دارو را در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری کنید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☒ به بیمار تذکر دهید که اثرات درمانی دارو ۳-۲ هفته بعد از شروع درمان ظاهر خواهد شد.
- ☒ به بیمار توصیه کنید تا مشخص نشدن اثرات دارو، از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ☒ به بیمار تذکر دهید در خلال درمان با این دارو، از مصرف سایر داروهای تضعیف دستگاه اعصاب مرکزی خودداری نماید.

☞ مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر اثبات نشده است، با اینحال تجویز این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.

SORBITOL h

Eva Sorbex, Glucitol, Sorbax

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : ملین

• طبقه‌بندی درمانی : ملین هیپراسموتیک

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Oral Solution: 70%

Powder: 5 g/Sachet

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

یبوست

☞ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: • حساسیت مفرط به هریک از اجزای دارو • آسم برونکیال • آمفیزم • بیمارهای شدید قلب عروقی • گلوکوم زاویه باریک • ملانوم • سابقه انفارکتوس میوکارد.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ جهت پیشگیری از تهوع، دارو را همراه با غذا تجویز کنید. مصرف غذاهای پرپروتئین، جذب دارو را کاهش می دهد.
✓ دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمائید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☐ به بیمار بیاموزید دارو را مطابق با دستور بکار برده و در صورت فراموش نمودن یک نوبت، اگر تا ۲ ساعت قبل از نوبت بعدی بخاطر آورد، آن را مصرف نماید. همچنین از دو برابر نمودن دوز دارو پرهیز نماید.
- ☐ به بیمار توضیح دهید مصرف غذا بلافاصله پس از مصرف دارو، (ظرف مدت کوتاهی پس از مصرف دارو) میزان تحریکات گوارشی را کاهش می دهد، ولی مصرف غذاهای پرپروتئین تأثیر لوودوپا را دچار اختلال می نماید. به بیمار گوشزد کنید که پروتئین مورد نیاز روزانه اش را بین وعده های مختلف غذا تقسیم نماید تا هم مقدار کافی پروتئین دریافت کرده و هم دارو مؤثر واقع شود. همچنین به بیمار تذکر دهید که در طول درمان با لوودوپا نباید بدون مشورت با پزشک در رژیم غذایی اش تغییرات قابل ملاحظه ای ایجاد کند.
- ☐ مصرف دارو احتمالاً باعث سرگیجه و خواب آلودگی می شود. به همین جهت به بیمار توصیه کنید تا مشخص نشدن تأثیر دارو، از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ☐ به بیمار گوشزد کنید جهت جلوگیری از هیپوتانسیون ارتوستاتیک از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نموده و افت فشارخون را به پزشک گزارش نماید.
- ☐ بی ضرر و بی خطر بودن تغییر رنگ ادرار و عرق (تیره شدن آنها) را برای بیمار توضیح دهید.
- ☐ به بیمار توصیه کنید در صورت بروز طیش قلب، احتباس ادرار، حرکات غیرارادی، تغییرات رفتاری، تهوع و استفراغ شدید یا ضایعات پوستی جدید به پزشک اطلاع دهد.

☞ مصرف در دوران شیردهی

این دارو ممکن است ترشح شیر را مهار کند. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

GEMFIBRAZIL h

Lopid

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مشتقات اسید فیبریک

• طبقه‌بندی درمانی : کاهش‌دهنده چربی خون

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Coated Tablets: 450 mg

Capsules: 300 mg

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

تیپ IV هیپرتری‌گلیسیریدمی و هیپرکلسترولمی‌های شدید که به رژیم غذایی و سایر داروها پاسخ نمی‌دهند.

☞ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: • حساسیت مفرط • بیماریهای کیسه صفرا • اختلال عملکرد کبد (نظیر سیروز اولیه صفراوی) • نارسایی شدید کلیه.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را در درجه حرارت 15-30°C نگهداری نمایید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☐ به بیمار بیاموزید دارو را کاملاً مطابق دستور مصرف نموده و به واسطه فراموش نمودن یک دوز حذف یا دو برابر نمودن دوزهای بعدی پرهیز نماید. اگر یک نوبت از دارو فراموش شد، باید بلافاصله پس از بخاطر آوردن مصرف نماید، مگر اینکه تقریباً زمانی تا موعد دوز بعدی باقی نمانده باشد.

☐ مصرف این دارو باید با رعایت محدودیتهای غذایی (چربی، کلسترول، کربوهیدرات)، انجام تمرینات بدنی و قطع مصرف سیگار همراه شود.

☐ به بیمار بیاموزید در صورت بروز هر یک از علائم زیر سریعاً به پزشک اطلاع دهد: دردهای شدید معدی همراه با تهوع و استفراغ، تب، لرز، گلودرد، همچنین در صورتی که دچار اسهال، راش پوستی، کرامپ عضلانی، ناراحتی منتشر شکمی یا نفخ مقاوم و درمان‌ناپذیر شد نیز باید به پزشک اطلاع دهد.

☞ مصرف در دوران شیردهی

بی‌ضرر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است.

DOPAMINE HCl h

Dopadic, Dopastat, Intropin

● طبقه‌بندی فارماکولوژیک : آدرنرژیک

● طبقه‌بندی درمانی : اینوتروپیک، تنگ‌کننده عروقی

● طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Injection: 200 mg/5 ml

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

درمان کمکی در شوک برای افزایش برون‌ده قلب، فشارخون و جریان ادرار
درمان کوتاه‌مدت در موارد شدید و مقاوم نارسایی احتقانی مزمن قلبی

☞ کنترل اندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیون‌ها: ● فنوکروموسیتوم ● تاکی‌آریتمی‌های اصلاح نشده ● فیبریلاسیون بطنی.
موارد احتیاط: ○ آسم ○ بیماری‌های ایسکمیک قلب ○ سابقه بیماری‌های انسدادی عروق و کاهش جریان خون اندام

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ هر آمپول ۱۰-۵ میلی‌لیتری باید در 250-500ml از محلول نرمال سالین، D5W، D5/NS و یا رینگر لاکتات رقیق شود.

✓ پیش از شروع درمان، هیپوولمی بیمار را از طریق ترکیبات افزایش‌دهنده حجم جبران نمایید.

✓ رقیق کردن دارو باید بلافاصله قبل از تجویز دارو صورت گیرد.

✓ محلول دوپامین را در برابر نور قرار ندهید و در صورت تغییر رنگ از مصرف آن خودداری کنید.

پیگیری و بررسی تأثیر دارو:

✓ فشارخون، نبض محیطی و برون‌ده ادراری بیمار را بدقت کنترل نمایید.

✓ در موارد زیر دوز دارو را کاهش دهید: کاهش برون‌ده ادراری بدون وجود هیپوتانسیون، تاکی‌کاردی پیشرونده، دیس‌ریتمی‌های قلبی، افزایش بیش‌ازحد فشارخون دیاستولیک، علائم ایسکمی محیطی.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☐ به بیمار توضیح دهید در صورت احساس درد در قفسه سینه، تنگی نفس، بیحسی، سوزن سوزن شدن احساس سوزش در انتهایها سریعاً پزشک را مطلع سازد.

☞ مصرف در دوران شیردهی

اگرچه ترشح این دارو در شیر ثابت نشده و عوارضی نیز برای آن در انسان گزارش نشده است، با این وجود منافع دارو

باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.

DIPHENOXYLATE h

Diphenatol, Latropine, Lofene, Lomanate, Lomotil, Lomotive, Lonox, Lo-Quel, Lo-Trol, Nor-Mil

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مخدر

• طبقه‌بندی درمانی : ضداسهال

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

🔍 فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets:

Diphenoxylate HCl 2.5 mg and

Atropine Sulfate 0.025 mg

🔍 اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

درمان علامتی اسهال حاد

🔍 کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط نسبت به این دارو، آتروپین یا مپیریدین ● یرقان انسدادی ● اسهال ناشی از کوا پسودوما مبرانو.
موارد احتیاط: ○ اسهال ناشی از مسمومیت یا شیگلا، سالمونلا و بعضی از گونه‌های اشریشیا کلی ○ اختلال عملکرد کبیر ○ سیروز ○ بیماری هیپاتورنال پیشرفته.

🔍 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ در صورت نیاز می‌توان قرص را خرد و همراه با مایعات تجویز نمود.
- ✓ دوزاژ دارو را باید در اولین فرصت و بلافاصله بعد از کنترل علائم اولیه بیمار، کاهش داد.
- ✓ دارو را باید در ظروف دربسته و مقاوم به نور و درجه حرارت $2-25^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمود.

🔍 آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☐ به بیمار بیاموزید دارو را مطابق دستور مصرف نموده و هرگز دوز دارو را افزایش ندهد، چون احتمال وابستگی دارویی و بروز علائم ناشی از مصرف مقادیر بیش از حد در کودکان وجود دارد.
- ☐ مصرف این دارو باعث خواب‌آلودگی می‌گردد، بنابراین به بیمار توصیه نمائید تا مشخص نشدن اثرات دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ☐ به بیمار توصیه نمائید در طی درمان با این دارو از مصرف داروهای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی پرهیز نماید.
- ☐ به بیمار بیاموزید در صورت مقاومت اسهال یا بروز تب، درد شکم، طپش قلب به پزشک اطلاع دهد.

🔍 مصرف در دوران شیردهی

با وجود ترشح متابولیت‌های این دارو در شیر، عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده است؛ با این حال منافع دارو در برابر ضررهای احتمالی آن باید سنجیده شود.

DIHYDROERGOTAMINE Mesylate h

D.H.E.45, Dihydrergot

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : آکالوئید ارگوت

• طبقه‌بندی درمانی : منقبض‌کننده عروق

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه X

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 2.5 mg

Injection: 1 mg/ml

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

جلوگیری و درمان سردردهای عروقی (میگرن و سردردهای کلاستر)

☞ کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیونها: • بیماریهای عروق محیطی • بیماری عروق کرونر • هیپرتانسیون • سپسیس • نارسایی کلیه • حساسیت مفرط • حاملگی.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ دارو را باید بلافاصله بعد از شروع علائم هشداردهنده میگرن مصرف نمود.
- ✓ فرم تزریقی دارو را باید در محل خنک و بدور از نور مستقیم قرار داد و از یخ‌زدن آن جلوگیری نمود. در صورت تغییر رنگ از مصرف آن خودداری نمایید.
- ✓ تزریق فرم وریدی رقیق نشده باید در طی ۵ دقیقه صورت بگیرد.
- ✓ دارو را باید در درجه حرارت 15-30°C نگهداری نمود.

☞ آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☐ به بیمار بیاموزید دارو را کاملاً مطابق تجویز مصرف نماید.
- ☐ به بیمار بیاموزید برای دستیابی به نتیجه مطلوب، با بروز اولین علامت حمله میگرن دارو را مصرف نموده و حداقل ۲ ساعت در یک اتاق آرام و تاریک دراز بکشد.
- ☐ به بیمار توصیه نمایید در طی مدت مصرف این دارو از استعمال دخانیات و قرارگرفتن در معرض سرمای شدید، خودداری نماید.

☞ مصرف در دوران شیردهی

شیردهی در حین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

DEXPANTHENOL h

Bepanthen, Depantex, Panthoderm

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنالوگ ویتامین B کمپلکس

• طبقه‌بندی درمانی: التیام‌دهنده پوستی

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه A (مصرف با دوز بالا: گروه C)

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Topical Cream: 5%

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

خارش؛ درماتوزهای خفیف؛ التهاب خفیف پوست؛ التهاب ناشی از تماس با بلوط سمی؛ زایش

حشرات؛ التهاب و تحریک مناطق از پوست نوزادان که در تماس با ادرار هستند؛

خراشیدگی و ساییدگی پوست نوزادان و کودکان

بالغین و کودکان: یک یا دو بار در روز بر روی ضایعات مالیده می‌شود. در صورت نیاز می‌توان دفعات مصرف را افزایش داد

LINDANE (GAMMA BENZENE Hexachloride) h

Kwell, Kwildane, Scabene

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک: هیدروکربن کلرینه حشره‌کش

• طبقه‌بندی درمانی: ضد جرب، ضد شپش

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه B

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Shampoo: 1%

Lotion: 1%

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

جرب (گال)

بالغین و کودکان: بعد از استحمام با آب و صابون، لایه نازکی از لوسیون را در تمام سطوح پوست مالیده و به آرامی ماساژ می‌دهیم؛ استفاده از لوسیون را باید از گردن شروع کرد و به انگشتان پا ختم نمود. بعد از ۸ تا ۱۲ ساعت باید دارو را با استحمام و شستشوی مناسب از روی بدن پاک کرد. در صورت لزوم می‌توان این درمان را یک هفته بعد مجدداً تکرار کرد.

آلودگی با شپش انسانی

بالغین و کودکان: شامپو یک بار در مناطق مبتلا مالیده می‌شود. شامپو باید به مدت ۴ تا ۵ دقیقه روی پوست باقی بماند و سپس شستشو داده شود و پس از شانه کردن؛ نیت‌ها (nits) جدا شوند. در صورت لزوم می‌توان این درمان را یک هفته بعد مجدداً تکرار کرد.

☞ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط.
موارد احتیاط: ○ دوران حاملگی.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را در ظروف دربسته و بدور از نور و گرما و درجه حرارت 15-30°C نگهداری کنید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار کاربرد دارو را آموزش داده و بر لزوم درمان همزمان تمام افراد خانواده تأکید نمائید.
☒ جهت جلوگیری از آلودگی مجدد یا انتشار بیماری، بیمار باید تمام البسه‌ای را که اخیراً مورد استفاده قرار داده، با آب خیلی داغ شستشو دهد و یا خشک‌شویی نماید.
☒ به بیمار توضیح دهید که ممکن است خارش پوستی بعد از درمان نیز باقی بماند؛ تکرار درمان فقط در صورت مشاهده شپش‌های زنده مجاز می‌باشد.

☞ مصرف در دوران شیردهی

به دلیل اینکه این دارو جذب سیستمیک دارد مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

LACTULOSE h
Cephulac, Chronulac

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : دی‌ساکارید

• طبقه‌بندی درمانی : مسهل

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه B

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Syrup: 10 g/15 ml

Powder for Solution: 10 g/Sachet

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

یبوست

پروفیلاکسی و درمان آنسفالوپاتی پورتال - سیستیمیک، شامل پره‌کوما و کوما و هیپاتیک در

افراد مبتلا به بیماری شدید کبد

برقراری حرکات روده بعد از برداشتن هموروئید

بعد از بلع باریم در آزمایش باریم انما

☞ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: ● آپاندیسیت ● شکم حاد جراحی ● fecal impaction ● انسداد روده.
موارد احتیاط: ○ دیابت ○ پروکتوسکوپی و کولونوسکوپی.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را همراه با آب‌میوه، آب و یا شیر تجویز کنید.

✓ دارو را در درجه حرارت اتاق و بدور از نور مستقیم نگهداری نمائید.

پیگیری و بررسی تأثیر دارو:

✓ در صورت ایجاد اسهال در کودک دوز دارو را کاهش و در صورت تداوم آن، مصرف دارو را قطع کنید.

✓ اثرات درمانی دارو در بیماران دچار آنسفالوپاتی کبدی بوسیله اصلاح EEG و بهبود وضعیت هشیاری بیمار مشخص می‌شود.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار توضیح دهید که مصرف این دارو احتمالاً باعث آروغ زدن، سسکه و کرامپ شکمی می‌گردد، اگر این عوارض برای بیمار مشکل ایجاد نمود یا دچار اسهال گردید باید به پزشک اطلاع دهد.

LEVODOPA-C h
L Doram-C, Sinemet

● طبقه‌بندی فارماکولوژیک : ترکیب لوودوپا و کاربی‌دوپا

● طبقه‌بندی درمانی : ضدپارکینسونیسم

● طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Scored Tablets:

Levodopa 100 mg and

Carbidopa 10 mg

Scored Tablets:

Levodopa 100 mg and

Carbidopa 25 mg

Scored Tablets (Forte):

Levodopa 250 mg and

Carbidopa 25 mg(as Monohydrate)

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

پارکینسونیسم ایدیوپاتیک؛ پارکینسونیسم بعداز آنسفالیت؛ پارکینسونیسم سمپتوماتیک

☞ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط به هریک از اجزای دارو ● آسم برونکیال ● آمفیزم ● بیماریهای شدید قلب عروقی ● گلوکوم زاویه باریک ● ملانوم ● سابقه انفارکتوس میوکارد.

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ جهت پیشگیری از تهوع، دارو را همراه با غذا تجویز کنید. مصرف غذاهای پرپروتئین، جذب دارو را کاهش می دهد.
- ✓ دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمایید.

- ✓ علائم حیاتی بیمار را در خلال درمان بدقت کنترل کنید.
- ✓ بیمار را باید از نظر بروز تغییرات رفتاری تحت نظر گرفت.
- ✓ مصرف این دارو ممکن است موجب از کنترل خارج شدن بیماری دیابت شود.
- ✓ در خلال درمان و در فواصل منظم قندخون، CBC، پتاسیم سرم و آزمایشهای بررسی عملکرد کلیه و کبد را درخواست کنید.

آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☒ به بیمار بیاموزید دارو را مطابق با دستور بکار برده و در صورت فراموش نمودن یک نوبت، اگر تا ۲ ساعت قبل از نوبت بعدی بخاطر آورد، آن را مصرف نماید. همچنین از دو برابر نمودن دوز دارو پرهیز نماید.
- ☒ به بیمار توضیح دهید مصرف غذا بلافاصله پس از مصرف دارو، (ظرف مدت کوتاهی پس از مصرف دارو) میزان تحرکات گوارشی را کاهش می دهد، ولی مصرف غذاهای پرپروتئین تأثیر لوودوپا را دچار اختلال می نماید. به بیمار گوشزد کنید که پروتئین مورد نیاز روزانه اش را بین وعده های مختلف غذا تقسیم نماید تا هم مقدار کافی پروتئین دریافت کرده و هم دارو مؤثر واقع شود. همچنین به بیمار تذکر دهید که در طول درمان با لوودوپا نباید بدون مشورت با پزشک در رژیم غذایی اش تغییرات قابل ملاحظه ای ایجاد کند.
- ☒ مصرف دارو احتمالاً باعث سرگیجه و خواب آلودگی می شود. به همین جهت به بیمار توصیه کنید تا مشخص نشدن تأثیر دارو، از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ☒ به بیمار گوشزد کنید جهت جلوگیری از هیپوتانسیون ارتوستاتیک از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نموده و افت فشارخون را به پزشک گزارش نماید.
- ☒ بی ضرر و بی خطر بودن تغییر رنگ ادرار و عرق (تیره شدن آنها) را برای بیمار توضیح دهید.
- ☒ به بیمار توصیه کنید در صورت بروز طیش قلب، احتباس ادرار، حرکات غیرارادی، تغییرات رفتاری، تهوع و استفراغ شدید یا ضایعات پوستی جدید به پزشک اطلاع دهد.

مصرف در دوران شیردهی

این دارو ممکن است ترشح شیر را مهار کند. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

LORATADINE

Claritin, Lorated, Loratin

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنتی‌هیستامین سه حلقه‌ای

• طبقه‌بندی درمانی: آنتی‌هیستامین

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه B

📌 فرآورده‌های ژنریک ایران

Scored Tablets: 10 mg

Syrup: 5 mg/5 ml

📌 اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

درمان علامتی رینیت آلرژیک فصلی، درمان کهیر مزمن ایدیوپاتیک

تنظیم دوزاژ

📌 کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط نسبت به این دارو.
موارد احتیاط: ○ اختلال عملکرد کبد ○ دوران شیردهی.

📌 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ به منظور جلوگیری از تأخیر در جذب دارو، لوراتادین را با معده خالی (یکساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا) تجویز نمایید.
- ✓ بی‌خطر بودن تجویز این دارو در کودکان کوچکتر از ۶ سال ثابت نشده است.
- ✓ دارو را در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمایید.

📌 آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ از بیمار بخواهید دارو را فقط یکبار در روز مصرف نماید و در صورت عدم بهبود به پزشک مراجعه نماید
☒ از بیمار بخواهید در صورتی که قصد انجام تست‌های آلرژی پوستی را دارد، لازم است حداقل ۴ روز قبل از انجام تست مصرف این دارو را قطع نماید.

📌 مصرف در دوران شیردهی

لوراتادین به راحتی در شیر مادر ترشح می‌شود. درمان با آنتی‌هیستامین‌ها در دوران شیردهی کنترااندیکه است.

LOPERAMIDE HCl h

Imodium, Imodium, Lomidex, Lopabid, Maalox Anti-Diarrheal, Pepto Diarrhea Control

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مشتقات پی‌پریدین

• طبقه‌بندی درمانی : ضداسهال

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه B

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 2 mg

Capsules: 2 mg

Oral Solution: 1 mg/5 ml

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

اسهال حاد و غیراختصاصی

اسهال مزمن

☞ کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● کودکان کوچکتر از ۲ سال ● حساسیت مفرط نسبت به دارو ● کولیت اولسراتیو شدید ● کولیت
پسودومامبرانوس ● اسهال حاد ناشی از E.Coli ● اسهال خونی.
موارد احتیاط: ○ اختلال عملکرد کبد ○ عفونت باکتریال.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را در درجه حرارت 15-30°C نگهداری نمائید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☐ از بیمار بخواهید در صورتی که ظرف چند روز بهبودی حاصل نشد و یا در صورت بروز درد، اتساع شکم یا تب به پزشک مراجعه نماید.

☐ از بیمار بخواهید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☐ به بیمار آموزش دهید جهت مقابله با خشکی دهان می‌توان از آدامس‌های بدون شکر استفاده نمود.

☐ مصرف در دوران شیردهی

تجویز این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.

FLUPHENAZINE h

Modecate Decanoate, Permitil hydrochloride, Prolixin, Prolixin Hydrochloride

● طبقه‌بندی فارماکولوژیک : فنوتیازین از مشتقات پی‌پرازین

● طبقه‌بندی درمانی : ضدسایکوز

● طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

📌 فرآورده‌های ژنریک ایران

Coated Tablets: Fluphenazine 2HCL 1 mg

Coated Tablets: Fluphenazine 2HCL 2.5 mg

Injection: Fluphenazine Decanoate 25 mg/ml

📌 اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

اختلالات سایکوتیک

📌 کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

● کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط ● دیس‌کرازیم‌های خونی ● دپرسیون مغز استخوان ● کوما ● ضایعات مغزی ● کلاپس عروقی ● بیماری عروق مغزی ● همراه با ترکیبات بلوک‌کننده آدرنرژیک یا بی‌حس‌کننده‌های نخاعی یا اپی‌دورال.

📌 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ در صورت تماس محلول تزریقی با پوست، آن ناحیه را با آب گرم شستشو دهید.
- ✓ تمام فرآورده‌های فلوپنازین را باید بدور از نور نگهداری نمود و از یخ زدن آن جلوگیری کرد.
- ✓ به علت ویسکوزیته بالا، جهت تزریق دارو از سرسوزن 21G یا بزرگتر استفاده نمایید.
- ✓ دارو را باید در درجه حرارت 15-30°C نگهداری کرد.

پیگیری و بررسی تأثیر دارو:

- ✓ بیمار را از نظر بروز علائم دپرسیون مغزی و علائم اکستراپیرامیدال تحت نظر بگیرید.
- ✓ در صورت مصرف درازمدت دارو، عملکرد کلیه را بطور متناوب بررسی نمایید. همچنین اندازه‌گیری WBC، آزمایشات عملکرد کبد و معاینات افتالمولوژیک در حین درمان ضروری است.
- ✓ فشارخون بیمار را در مراحل اولیه درمان کنترل نمایید.
- ✓ میزان I&O و وضعیت اجابت مزاج بیمار را کنترل کنید.

آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی:** ☒ به بیمار بیاُموزید دارو را مطابق دستور مصرف نموده و از حذف یا دو برابر کردن دوزهای دارو بخاط فراموش نمودن یک نوبت آن پرهیز نماید.
- ☒ قطع ناگهانی دارو باعث گاستریت، تهوع، استفراغ، سرگیجه، سردرد، تاکیکاردی و بی خوابی می شود.
- ☒ برای بیمار احتمال بروز واکنشهای اکستراپیرامیدال و اختلالات حرکتی تأخیری را شرح داده و توصیه نمائید در صورت بروز علائم مربوط به این عوارض سریعاً به پزشک اطلاع دهد.
- ☒ به بیمار توصیه نمائید جهت پیشگیری از بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نماید.
- ☒ مصرف این دارو باعث خواب آلودگی می گردد. به همین جهت به بیمار توصیه نمائید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ☒ به بیمار تذکر دهید از مصرف داروهای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی همزمان با فلوپنازین پرهیز نماید.
- ☒ به بیمار توصیه نمائید هنگام قرار گرفتن در معرض نور خورشید از کرم های ضد آفتاب و لباسهای محافظ استفاده کند. بر روی سطوحی که در معرض آفتاب قرار می گیرند پیگمانتاسیون آبی - خاکستری ایجاد می گردد که احتمالاً پس از قطع درمان بر طرف می شود. این بیماران باید از قرار گرفتن در هوای گرم نیز اجتناب نمایند. چون فلوپنازین سیستم تنظیم درجه حرارت بدن را دچار اختلال می نماید.
- ☒ به بیمار توضیح دهید مصرف این دارو باعث تغییر رنگ ادرار به صورتی تا قهوه ای متمایل به قرمز می گردد.
- ☒ به بیمار بیاُموزید در صورت گلودرد، تب، خونریزی یا خون مردگی غیرعادی، راش پوستی، ضعف، لرز، اختلال بینایی، تیرگی رنگ ادرار و رسی شدن مدفوع بلافاصله به پزشک اطلاع دهد.

مصرف در دوران شیردهی

در صورت نیاز به تجویز، منافع این دارو باید در مقابل ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.

FLUCONAZOLE h

Diflucan

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مشتقات بیس - تریازول

• طبقه‌بندی درمانی : ضدقارچ

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Capsules or Tablets: 50 mg

Capsules or Tablets: 100 mg

Capsules or Tablets: 150 mg

Capsules or Tablets: 200 mg

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

کاندیدیاز اوروازوفاژیا و ازوفاژیا

کاندیدیاز واژینال

کاندیدیاز سیستمیک

مننژیت کریپتوکوکال

پروفلایکسی در بیمارانی که تحت پیوند مغز استخوان قرار می‌گیرند

عفونت دستگاه ادراری و پریتونیت قارچی

☞ عفونت کاندیدیایی، ساپرسیون درازمدت در بیماران مبتلا به عفونت HIV

☞ پروفلایکسی در مقابل کاندیدیاز جلدی - مخاطی، کریپتوکوکوز، کوک سیدیومایکوز یا

هیستوپلاسماز در بیماران مبتلا به عفونت HIV

☞ کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط نسبت به این دارو و سایر ترکیبات مشابه.

Fluconazole n

🔍 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ از تجویز و مصرف همزمان این دارو با استمیزول، ترفنادین و سیزاپراید پرهیز شود.
 - ✓ دارو را در ظروف دربسته و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری کنید.
 - ✓ به محلول انفوزیون وریدی این دارو، نباید داروی دیگری اضافه نمود.
- پیگیری و بررسی تأثیر دارو:**
- ✓ پیش از شروع درمان و سپس در فواصل منظم در خلال درمان آزمایشات بررسی عملکرد کلیه و کبد را بعمل آورید.
 - ✓ درمان باید بعد از انجام کشت مناسب شروع شود.

🔍 آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☒ به بیمار تذکر دهید، درمان با این دارو طولانی مدت است و باید مصرف دارو تا پایان دوره درمانی بطور دقیق ادامه یابد.
- ☒ به بیمار تذکر دهید در صورت بروز زردی، تغییر رنگ ادرار، بی رنگ شدن مدفوع، خارش و کاهش حجم ادرار به پزشک مراجعه نماید.
- ☒ به بیمار توصیه نماید، جهت کاهش عوارض گوارشی، دارو را همراه با غذا مصرف نماید.
- ☒ به بیمار یادآوری نمائید در صورت استفاده از قرص های ضد بارداری خوراکی، در خلال درمان با این دارو از سایر روش های مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده نماید.

🔍 مصرف در دوران شیردهی

این دارو با غلظت مشابه سرم در شیر مادر ترشح می شود. بنابراین تغذیه با شیر مادر در خلال درمان با این دارو توصیه نمی شود.

KETOCONAZOLE (Systemic) h
Nizoral

- طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مشتقات ایمیدازول
- طبقه‌بندی درمانی: ضدقارچ سیستمیک
- طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Scored Tablets: 200 mg

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

عفونتهای شدید قارچی ناشی از ارگاناسمهای حساس
☞ کارسینوم پروستات

☞ کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط.
موارد احتیاط: ○ بیماری کبدی.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ اغلب در شروع درمان تهوع و استفراغ در بیمار دیده می‌شود. بمنظور پیشگیری از این حالت می‌توان دارو را همراه با غذا و منقسم در دو دوز تجویز نمود. دارو را نباید همراه با آنتی‌اسید تجویز کرد.
- ✓ دارو را می‌توان همراه با آب، آب میوه، قهوه و یا چای تجویز کرد. کتوکونازول جهت حل شدن و جذب شدن نیاز به محیط اسیدی دارد.
- ✓ دارو را در ظروف دربسته و بدور از نور و درجه حرارت 15-30°C نگهداری کنید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار توصیه نمائید دوره درمان را کامل نماید و دارو را کاملاً مطابق با تجویز مصرف کند در صورتی که مصرف یک دوز دارو را فراموش کرد، به محض بیدار شدن آن را مصرف کند و اگر تقریباً زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده باشد، بین مصرف دوز فراموش شده و دوز بعدی حداقل ۱۲-۱۰ ساعت فاصله بگذارد.

☒ به بیمار توصیه نمائید، در صورت مصرف همزمان این دارو با آنتاگونیست‌های گیرنده H₂ (سایمتیدین و رانیتیدین)، این داروها را حداقل دوساعت بعد از کتوکونازول مصرف نمایند.

☒ به بیمار توصیه نمائید تا مشخص نشدن اثرات دارو، از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☞ مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر ترشح می‌شود و احتمال بروز کریکتروس را در شیرخوار افزایش می‌دهد. تغذیه با شیرمادر در حین درمان با این دارو و ۴۸ ساعت پس از قطع دارو توصیه نمی‌شود.

COLCHICINE h
Modacine

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : آلكالوئيد كلشسيوم اتومنال

• طبقه‌بندی درمانی : ضدنقرس

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه D

📌 فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 1 mg

📌 اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزان

جلوگیری از حملات حاد نقرس بعنوان پروفیلاکسی یا درمان نگهدارنده

جلوگیری از حملات نقرس در بیمارانی که قرار است تحت عمل جراحی قرار گیرند

✖ سپروز کبدی

✖ سپروز صفراوی اولیه

✖ ساپرس کننده آمیلوئیدوز

✖ ساپرس کننده درماتیت هرپتی فرم

نقرس حاد؛ آرتریت حاد نقرسی

✖ تب مدیترانه‌ای فامیلیال

✖ ضد استئولیز در بیماری پازه

📌 کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیونها: ● بیماران مبتلا به بیماریهای شدید دستگاه گوارش، کلیه و قلبی ● دیسکرازیهای خونی ● حساسیت مفرط.

موارد احتیاط : ○ بیماران مسن و ناتوان.

📌 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ جهت کاهش تحریک دستگاه گوارش، دارو را همراه با شیر یا غذا تجویز نمائید.

✓ جهت جلوگیری از مسمومیت تجمعی دارو، باید بین دوره‌های تجویز دارو برای درمان نقرس حاد حداقل سه‌روز فاصله باشد.

✓ دارو را در ظروف دربسته، مقاوم به نور و درجه حرارت 15-30°C نگهداری نمائید.

کتبی سن

آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیماران توصیه نمائید دوز فراموش شده دارو را بلافاصله پس از به خاطر آوردن مصرف نماید، همچنین

از دو برابر نمودن دوزهای بعدی پرهیز نماید.

☒ به بیمار بیاموزید بروز علایمی نظیر: تهوع، استفراغ، درد شکمی، اسهال، خونریزی یا خون مردگی غیرعادی، گلودرد، ضعف، سستی و راش را به پزشک اطلاع دهد.

مصرف در دوران شیردهی

بی ضرر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی به اثبات نرسیده است و مشخص نشده که این دارو در شیر مادر ترشح

می شود یا خیر.

GRISEOFULVIN h

Fulvicin-U/F, Grifulin, Grifulvin V, Grisactin

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلیوم

• طبقه‌بندی درمانی: ضدقارچ

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 125 mg

Scored Tablets: 500 mg

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

عفونت‌های قارچی پوست، مو و ناخن

کچلی پا و کچلی ریش

☞ کنترل‌اندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنترل‌اندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط ● نارسایی هپاتوسلولار ● پورفیری.
موارد احتیاط: ○ حساسیت به پنی‌سیلین.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ جهت کاهش عوارض گوارشی، دارو را همراه یا بعد از غذا تجویز نمائید.
✓ دارو را در ظرف دربسته و در درجه حرارت $2-25^{\circ}\text{C}$ نگهداری کنید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار بیاموزید جهت تکمیل دوره درمان، مصرف دارو به مدت چندین هفته ضروری است در صورتی که یک دوز دارو را فراموش نمود باید بلافاصله پس از بخاطر آوردن آن را مصرف کند؛ مگر اینکه فاصله چندانی تا زمان مربوط به دوز بعدی وجود نداشته باشد.

☒ مصرف این دارو، باعث سرگیجه می‌گردد. به همین جهت به بیمار توصیه نمائید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☒ به بیمار توصیه نمائید در طی درمان باید از شیوه‌های پیشگیری از بارداری غیرهورمونی استفاده نموده و در صورت تصمیم یا شک به باردار شدن به پزشک اطلاع دهد.

☒ به بیمار توصیه نمائید بروز علایمی چون راش، گلودرد، تب، اسهال یا زخم‌های دهانی یا روی زبان را به پزشک اطلاع دهد.

☞ مصرف در دوران شیردهی

بی‌ضرر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است.

METHIMAZOLE h
Tapazole

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : آنتاگونیست هورمون تیروئید

• طبقه‌بندی درمانی : ضد هیپرتیروئیدی

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه D

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 5 mg

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

هیپرتیروئیدیسم؛ بحران تیروئیتوکسیکوز

آمادگی قبل از تیروئیدکتومی

☞ کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیونها: • سابقه واکنش افزایش حساسیت • دوران شیردهی.
موارد احتیاط: • بیماران با سن بالای ۴۰ سال و دوزاژ بالاتر از 40mg/day • اختلال عملکرد کبد • عفونتها.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را در ظروف مقاوم به نور و درجه حرارت 15-30°C نگهداری کنید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☐ به بیمار آموزش دهید دارو را مطابق تجویز و هر روز در زمان معینی بکار برده و در صورت فراموش نمودن یک نوبت، بلافاصله پس از بخاطر آوردن آن را مصرف کند ولی اگر تقریباً فرصتی تا زمان مصرف دوز بعدی وجود نداشته هر دو را همزمان مورد استفاده قرار دهد. در موارد فراموش شدن بیش از یک نوبت از دارو یا نیاز به قطع درمان، با پزشک خود مشورت نماید.

☐ ممکن است مصرف متیمازول باعث خواب‌آلودگی شود. به بیمار توجه دهید که پس از مصرف دارو تا مشخص نشدن تأثیر آن از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☐ به بیمار گوشزد نمائید بروز علائمی چون گلودرد، تب، لرز، سردرد، احساس ناخوشی، ضعف، زردی چشم‌ها یا پوست، خونریزی یا خونمردگی غیرمعمول، راش یا علایم هیپر و هیپوتیروئیدیسم را سریعاً به پزشک اطلاع دهد.

☞ مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر ترشح می‌شود. تغذیه با شیر مادر در حین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

METOPROLOL Tartrate

Lopressor, Metoral, Toprol XL

- طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مسدودکننده گیرنده بتا آدرنرژیک
- طبقه‌بندی درمانی : ضد هیپرتانسیون، درمان کمکی در انفارکتوس میوکارد حاد
- طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C (در سه ماهه دوم و سوم حاملگی: گروه D)

فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 50 mg

Tablets: 100 mg

Injection: 5 mg/5 ml

اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

فشارخون خفیف تا شدید

انفارکتوس میوکارد

آنژین

کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

- حساسیت مفرط نسبت به این دارو و سایر بتابلوکرها • برادیکاردی سینوسی • بِلوک قلبی • شوک کاردیوژنیک • نارسایی شدید قلبی • برادیکاردی شدید • هیپوتانسیون.
- موارد احتیاط : ○ اختلال عملکرد کبد ○ بیماریهای ریوی ○ دیابت.

توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ دارو را می‌توان، قبل یا بعد از غذا تجویز نمود.
- ✓ در صورت نیاز به تجویز وریدی هر 5mg از دارو باید در خلال ۶۰ ثانیه تجویز شود.
- ✓ دارو را در ظروف مقاوم به نور و رطوبت و درجه حرارت 15-30°C نگهداری نماید.

آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☐ نحوه شمارش نبض را به بیمار آموزش دهید و از او بخواهید در صورتی که ضربان نبض او کمتر از ۶۰ بار در دقیقه بود به پزشک مراجعه نماید.
- ☐ به بیمار تذکر دهید جهت جلوگیری از بی‌خوابی، دارو را در انتهای شب مصرف ننماید.
 - ☐ به بیماران دیابتی تذکر دهید در خلال درمان با این دارو، قندخون خود را بدقت کنترل نمایند.
 - ☐ از بیمار بخواهید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
 - ☐ از بیمار بخواهید دارو را دقیقاً مطابق تجویز پزشک مصرف نموده و از تغییر دوزاژ یا قطع ناگهانی دارو پرهیز نماید.
- در صورت نیاز به قطع دارو، این کار باید تدریجی و در خلال ۲-۱ هفته صورت گیرد.

مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود. شیردهی در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

MUPIROCIN (Topical) h

Bactroban

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنتی‌بیوتیک، اسید پسودومونیک A

• طبقه‌بندی درمانی: ضدباکتری موضعی

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه B

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Topical Ointment: 2%

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

درمان موضعی زرد زخم ناشی از استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوک بتا — همولیتیک و استرپتوکوک پیوژن

☞ کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط نسبت به دارو.
موارد احتیاط: ○ بیماران دچار سوختگی ○ اختلال عملکرد کلیه.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمایید.

✓ مصرف طولانی و مکرر دارو ممکن است منجر به عفونت ثانوی با ارگانیسم‌های غیرحساس گردد.
✓ پاسخ درمانی اغلب ظرف ۳-۵ روز ایجاد می‌گردد؛ در صورت عدم پاسخ درمانی بعد از ۵ روز، بیمار را مجدداً مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید.

✓ در صورت بروز علائم درماتیت تماسی، مصرف دارو را قطع نمایید.
✓ در صورت استفاده دارو بر روی مناطق دچار سوختگی و یا زخم‌های بزرگ، جذب پلی‌اتیلن گلیکول موجود در دارو ممکن است باعث مسمومیت و خیم‌کلیوی گردد.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☐ از بیمار بخواهید قبل از مصرف دارو ناحیه مبتلا را به خوبی شسته و خشک نماید و سپس لایه نازکی پماد را بر روی ضایعه مالیده و به آرامی ماساژ دهد.

☐ در مورد پماد بینی از بیمار بخواهید نیمی از پماد را در هر یک از حفرات بینی بمالد. پماد بینی به صورت یکبار مصرف طراحی شده است.

☐ باید از تماس دارو با چشم خودداری به عمل آید.

☞ مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است؛ با این حال تجویز آن در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.

METHYL ERGONOVINE Maleate h
Methergine

● طبقه‌بندی فارماکولوژیک : آلكالوئيد ارگوت

● طبقه‌بندی درمانی : اكسی‌توسيك

● طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

📌 فرآورده‌های ژنریک ایران

Scored Coated Tablets: 0.125 mg

Injection Solution: 0.2 mg/ml

📌 اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

پیشگیری و درمان خونریزی بعد از زایمان ناشی از آتونی رحم یا خوب جمع نشدن رحم

📌 کنترا اندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنترا اندیکاسیون‌ها: ● حساسیت به ترکیبات ارگو ● تهدید به سقط ● تحریک زایمان و قبل از زایمان جفت.
موارد احتیاط: ○ هیپرتانسیون ○ بیماریهای کبدی، کلیوی و قلبی.

📌 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ در صورت نیاز به تجویز وریدی، دارو را با 5ml نرمال سالین رقیق کرده و به صورت آهسته حداقل در خلال یک دقیقه انفوزیون کنید.

✓ در صورت تغییر رنگ و یا وجود عناصر معلق در محلول از تجویز آن خودداری نمایید.

✓ بدلیل احتمال افزایش فشار تا حد امکان از تجویز وریدی دارو پرهیز نمایید.

✓ دارو را در درجه حرارت 15-30°C نگهداری کنید.

پیشگیری و بررسی تأثیر دارو:

✓ علائم حیاتی بیمار (بخصوص فشارخون) و پاسخ رحم را بدقت کنترل نمایید.

📌 آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☐ به بیمار بیاموزید دارو را مطابق دستور مصرف نماید و از دو برابر کردن یا حذف دوزهای دارو پرهیز نماید. در صورت فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو، از کاربرد آن چشم‌پوشی نموده و مطابق برنامه تنظیم شده درمان را ادامه دهد.

☐ به بیمار توصیه نمائید که مصرف این دارو باعث کرامپ‌های شبه قاعدگی خواهد شد.

☐ به بیمار تذکر دهید که به علت ایجاد انقباض عروق ناشی از تأثیر نیکوتین، از مصرف سیگار خودداری نماید.

☐ به بیمار توصیه کنید در صورت بروز عفونت پزشک را مطلع سازد. چون این امر سبب افزایش حساسیت فردی نسبت به این دارو می‌گردد.

📌 مصرف در دوران شیردهی

این دارو ترشح شیر را مهار می‌کند. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

MIDAZOLAM h

Midazolam-TC, Midazolex, Versed

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک: بنزودیازپین

• طبقه‌بندی درمانی: ضد اضطراب، آرامبخش

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه D

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Injection: 5 mg/1 ml (as HCl)

Injection: 10 mg/2 ml (as HCl)

Injection: 15 mg/3 ml (as HCl)

Syrup: Midazolam HCl 2 mg/ml

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

جلوگیری از اضطراب قبل از جراحی

☞ کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیونها: ● حساسیت مفرط نسبت به بنزودیازپین‌ها ● هیپوتانسیون و شوک.
موارد احتیاط: ○ نارسایی احتقانی قلب ○ اختلال شدید عملکرد کبد یا کلیه ○ بیماران مسن و ناتوان ○ گلو
○ بیمارهای انسدادی مزمن ریوی.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ تزریق وریدی سریع دارو ممکن است منجر به دپرسیون تنفسی گردد، دارو را توسط محلول نرمال سالین و یا دکستروز 5 % تا غلظت 0.25mg/ml رقیق و سپس انفوزیون کنید.
- ✓ جهت تجویز عضلانی، دارو را بطور عمقی در عضلات بزرگ تزریق نمائید.
- ✓ دارو را در درجه حرارت 15-30°C نگهداری کنید.
- پیگیری و بررسی تأثیر دارو:
- ✓ در هنگام انفوزیون دارو، محل تزریق را از نظر بروز علائم نشت دارو (قرمزی، درد و تورم) بررسی نمائید.
- ✓ نیمه عمر دارو در افراد چاق طولانی‌تر است، بنابراین زمان اثر دارو طولانی‌تر است. علائم حیاتی بیمار را حتی بعد از انتقال به ریکاوری بدقت کنترل کنید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

- اطلاعات کلی: ☒ به بیمار بیاموزید جهت جلوگیری از بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نما؛
- ☒ مصرف این دارو باعث خواب‌آلودگی می‌گردد. به بیمار بیاموزید از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.

☞ مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر ثابت نشده و مصرف آن در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.

MEDROXYPROGESTERONE Acetate h

Amen, Curretat, Cytrin, Depo-Provera, Provera

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک: پروژستین مصنوعی

• طبقه‌بندی درمانی: پروژستین، ضدتئوپلاسم

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه X

📌 فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 5 mg

Tablets or Scored Tablets: 250 mg

Injection: 150 mg/ml

Injection: 500 mg/5 ml

📌 اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

آمفوره ثانویه

جلوگیری از حاملگی

خونریزی فونکسیونل رحم

کارسینوم آندومتر یا کلیه

📌 کنترل اندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیون‌ها: • سابقه واکنش افزایش حساسیت • حاملگی • سقط فراموش شده • اختلالات ترومبوآمبو
• بیماری‌های عروق مغزی • اختلالات شدید عملکرد کبد • سرطان پستان یا سرطانهای دستگاه تناسلی • پورفیری.
موارد احتیاط: • سابقه بیماری‌های کبدی • اختلال عملکرد کلیه • بیماری‌های قلبی - عروقی • اختلالات همراه
تشنج • دپرسیون CNS.

📌 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ جهت کاهش دیسترس گوارشی، بهتر است دارو را همراه با غذا تجویز کرد.
- ✓ جهت تزریق عضلانی، تزریق را باید بطور عمیق در عضلات ناحیه گلوئیتال انجام داد.
- ✓ دارو را در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری کنید.

آموزش بیمار / خانواده

دوره آموزشی

اطلاعات کلی: برنامه مصرف دارو را برای بیمار توضیح داده و توصیه نمائید حتماً دارو را سر وقت معینی مصرف نمود و در صورت فراموش نمودن یک نوبت، به محض به خاطر آوردن آن را مصرف کند ولی از دو برابر نمودن نوبت بعدی پرهیز نماید.

به بیمارانی که دارو را جهت درمان اختلالات قاعدگی مصرف می کنند، توضیح دهید که ۷-۳ روز پس از قطع دارو خونریزی خواهند داشت.

به بیمار تأکید کنید در صورت بروز علائمی چون تغییرات بینایی، ضعف ناگهانی، عدم هماهنگی، اشکال در تکلم، سردرد، درد ساق پا، کوتاهی تنفس، درد قفسه سینه، تغییر در الگوی خونریزی واژینال، زردی پوست، تورم انتهایها، افسردگی یا راش به پزشک اطلاع دهد.

به بیمار توصیه نمائید که احتمالاً پس از مصرف دارو دچار خونریزی از لثه خواهد شد. اهمیت رعایت بهداشت دهان و دندان و معاینات دوره ای توسط دندانپزشک را برای بیمار توضیح دهید.

به بیمار بیاموزید در صورت قطع قاعدگی یا شک به بارداری به پزشک اطلاع دهد و جهت کاهش احتمال بروز آسیب های جنینی تا ۳ ماه پس از قطع درمان تلاشی جهت بارداری نداشته باشد.

در صورتی که بیماران تحت درمان با این دارو در معرض آفتاب قرار گیرند، ممکن است لکه های قهوه ای رنگی به نام ملاسما در روی پوست صورتشان ایجاد شود و به همین جهت به بیمار توصیه کنید هنگام خروج از منزل از قرار گرفتن در معرض نور پرهیز نموده، از عینک آفتابی یا لباس های محافظ استفاده نماید.

بر اهمیت انجام آزمون های پیگیر فیزیکی نظیر کنترل فشارخون، آزمون پستان، شکم، آزمون های لگنی و پاپ اسمیر هر ۶-۱۲ ماه یکبار تأکید نمائید.

مصرف در دوران شیردهی

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

NITROFURANTOIN

Furadantin, Furalan, Furan, Furanite, Furantoin, Nitrofan

● طبقه‌بندی فارماکولوژیک : نیتروفوران

● طبقه‌بندی درمانی : آنتی‌سپتیک دستگاه ادراری

● طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه B

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Scored Tablets: 100 mg

Oral Suspension: 25 mg/5 ml

☞ اندیکاسیونها، راه مصرف و دوز

پیلونفریت، پیلیت و سیستیت ناشی از ارگانیسمهای حساس

درمان طولانی‌مدت و ساپرس‌کننده UTI

☞ کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیونها: ● اختلال شدید عملکرد کلیه (کلیرانس کراتینین کمتر از 40ml/min) ● نوزادان ● زنان حامله ● کمبود آنزیم گلوکز ۶ - فسفات دهیدروژناز (G6PD) ● حساسیت مفرط. موارد احتیاط: ○ دیابت ملیتوس ○ آسم ○ آنمی ○ کمبود ویتامین B ○ اختلالات الکترولیتی.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ جهت جلوگیری از تحریک دستگاه گوارش، دارو را همراه با غذا یا شیر تجویز نمایید.
✓ بدلیل احتمال رنگ‌پذیری دندان‌ها، بیمار باید از خوردن قرص خودداری نموده و سوسپانسیون دارو را می‌توان در شیر، آب و یا آب‌میوه رقیق نمود.
✓ دارو را در ظروف مقاوم به نور نگهداری نمایید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☐ به بیمار بیاموزید دارو را کاملاً مطابق دستور و در وقت معین مصرف کند و در صورت فراموش نمودن یک دوز بلافاصله پس از بخاطر آوردن با رعایت حداقل فاصله ۴-۲ ساعتی با دوز بعدی آن را مصرف نموده و از حذف دوز فراموش شده یا دو برابر کردن دوز بعدی پرهیز نماید.
☐ احتمالاً مصرف دارو باعث سرگیجه و خواب‌آلودگی خواهد شد. به بیمار توصیه کنید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
☐ به بیمار توضیح دهید که ممکن است بدن‌بال مصرف دارو، ادرارش به رنگ زرد تیره (زنگ زده) تا قهوه‌ای درآید که مسأله قابل توجهی نیست.
☐ به بیمار توصیه کنید در صورت بروز علائمی چون تب، لرز، سرفه، درد قفسه سینه، تنگی نفس، راش پوستی، کرختی یا سوزن سوزن شدن انگشتان دست یا پا به پزشک مراجعه نماید.
☐ همچنین توصیه نمائید که بروز علائم عفونت ثانویه (ادرار شیری رنگ و متعفن، تحریک پرینه، درد موقع دفع ادرار) را اطلاع دهد.

☞ مصرف در دوران شیردهی

بی‌ضرر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است. هر چند این دارو با غلظتهای کم در شیر ترشح می‌شود، با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.

NAPROXEN h

Anaprox, Modaxen, Naprosyn, Naproxen-AR

- طبقه‌بندی فارماکولوژیک : ضدالتهاب غیراستروئیدی
- طبقه‌بندی درمانی : ضددرد غیرمخدر، ضدتب، ضدالتهاب
- طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه B (در سه ماهه سوم بارداری: گروه D)

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 250 mg

Enteric Coated Tablets: 500 mg

Suppositories: 500 mg

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

درد خفیف تا شدید عضلانی - استخوانی و تحریک بافت نرم

درد خفیف تا متوسط، دیسمنوره اولیه

نقرس حاد

آرتريت روماتوئيد جوانان

☞ کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

- کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط نسبت به این دارو و یا سایر داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی.
- موارد احتیاط: ○ سابقه آنژیوادم ○ بیماریهای دستگاه گوارش ○ زخم پپتیک ○ بیماریهای کلیوی یا قلبی ○ حاملگی (به‌خصوص سه‌ماهه سوم).

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ ناپروکسن را می‌توان همراه با غذا یا یک آنتی‌اسید تجویز کرد.
- ✓ دارو را در ظروف دربسته و درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمایید.

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار پیاموزید دارو را مطابق دستور مصرف نماید و در صورت فراموش نمودن یک نوبت، بلافاصلاً پس از به خاطر آوردن آن را مصرف نماید، مگر اینکه فرصتی تا زمان نوبت بعدی وجود نداشته باشد و از دوبرابر نمودن مقادیر دارو در هر نوبت پرهیز نماید.

- ☒ به بیمار پیاموزید دارو را همراه با یک لیوان آب مصرف نموده و دقیقه پس از مصرف به حالت قائم باقی بماند.
- ☒ مصرف این دارو ممکن است باعث سرگیجه و خواب‌آلودگی گردد. به بیمار توصیه کنید تا مشخص نشدن واکنش بدن نسبت به دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ☒ به بیمار توصیه نمائید از مصرف همزمان اسپیرین، استامینوفن و سایر داروهای O.T.C. بدون مشورت با پزشک خودداری نماید.
- ☒ به بیمار پیاموزید در صورت بروز علایمی چون راش، خارش، لرز، تب، اختلال بینایی، تیرگی مدفوع، اسهال یا سردرد مقاوم به پزشک اطلاع دهد.
- ☒ به بیمار توصیه کنید قبل از شروع هر نوع درمان یا عمل جراحی، پزشک یا دندانپزشک خود را از رژیم دارویی اش مطلع سازد.

☑ مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود و مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

NICLOSAMIDE h

Niclocide

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : سالیسیلانیلید

• طبقه‌بندی درمانی : ضدکرم

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه B

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Chewable Tablets: 500 mg

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

کرم‌های نواری (دیفلوبوتریوم لاتوم و تنیا ساژیناتا)

کرم نواری کوتوله (همینولپیس نانا)

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ بهتر است دارو را با معده خالی (یکساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا) تجویز نمود.
✓ دارو را در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمائید.

☞ آموزش بیمار / خانواده

به بیمار توصیه نمائید که این دارو را پس از یک غذای سبک مصرف نماید.

☒ به بیمار بیاموزید قبل از بلعیدن، قرص‌ها را بطور کامل جویده و خرد نماید.

☒ به بیمار بیاموزید دوره درمان را کامل نماید و دارو را کاملاً مطابق دستور مصرف و در صورتی که یک دوز دارو را فراموش نمود به محض بیدار شدن آن را مصرف نماید، ولی اگر تقریباً زمان مصرف دوز بعدی فرارسیده باشد لازم است بین مصرف دوز فراموش شده و دوز بعدی حداقل ۱۲ ساعت فاصله بگذارد.

☞ مصرف در دوران شیردهی

این دارو به مقدار بسیار کمی از دستگاه گوارش جذب می‌شود، ترشح آن در شیر ثابت نشده و عوارضی نیز برای انسان گزارش نشده، با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.

NALOXONE HCl h

Narcan

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنتاگونیست نارکوتیک‌ها (اپیوئید)

• طبقه‌بندی درمانی: آنتاگونیست نارکوتیک‌ها

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: گروه B

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Injection Solution: 0.4 mg/ml

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزانژ

دپرسیون تنفسی ناشی از مصرف نارکوتیک‌ها

دپرسیون ناشی از نارکوتیک‌ها بعد از اعمال جراحی

آسفیکسی نئوناتوروم

☞ کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط نسبت به دارو.

موارد احتیاط: ○ دیس‌ریتمی‌های فوق‌بطنی ○ تروما به سر و افزایش فشار اینتراکرانیا ل ○ دوران حاملگی و زایمان ○ سابقه تشنج ○ بیماران مسن و ناتوان ○ معتادان به نارکوتیک‌ها.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ می‌توان دارو را رقیق نشده استفاده کرد. برای انفوزیون وریدی از D5W و یا نرمال سالین استفاده نمائید.

✓ با حل کردن 2mg در 500ml غلظت نهایی 0.004mg/ml حاصل می‌شود.

✓ دارو را دور از نور شدید و درجه حرارت 15-30°C نگهداری نمائید.

پیگیری و بررسی تأثیر دارو:

✓ وضعیت تنفسی و سایر علائم حیاتی بیمار را بدقت کنترل کنید.

✓ بیمارانی که تحت عمل جراحی و یا اعمال مامایی و زایمان قرار گرفته‌اند را از نظر بروز خونریزی کنترل نمائید، زیرا تجویز نالوکسان ممکن است منجر به اختلال در تستهای انعقادی بیمار شود.

☞ مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است. با این حال منافع دارو در برابر ضررهای احتمالی آن باید سنجیده شود.

WARFARIN Sodium

Coumadin, Panwarfin, Sofarin

● طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مشتقات کومارین

● طبقه‌بندی درمانی : ضد انعقاد

● طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه X

📌 فرآورده‌های ژنریک ایران

Scored Tablets: 2.5 mg

Scored Tablets: 5 mg

📌 اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

آمبولی ریوی؛ ترومبوز وریدهای عمقی؛ انفارکتوس میو کارد؛ بیماری‌های روماتیسمی قلبی
همراه با تخریب دریچه‌های قلبی؛ دیس‌ریتمی‌های دهلیزی

📌 کنترل اندیکاسیونها و موارد احتیاط

کنترل اندیکاسیونها: ● خونریزی فعال ● سرطانهای احشایی ● زخمهای دستگاه گوارش ● بیماریهای شدید کبد
ریوی ● هیپرتانسیون شدید و کنترل نشده ● آندوکاردیت تحت‌حاد باکتریال ● کمبود ویتامین K ● بعد از اعمال جراحی
مغز، چشم و نخاع.
موارد احتیاط: ○ دیورتیکولیت ○ کولیت ○ هیپرتانسیون خفیف یا متوسط ○ اختلال عملکرد خفیف یا متوسط کلیه
کبد ○ دوران شیردهی ○ بیماران با هر نوع لوله درناژ.

📌 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ در صورت نیاز می‌توان قرص را قبل از مصرف خرد و همراه با مایعات تجویز کرد.
✓ دارو را در ظروف مقاوم به نور و رطوبت نگهداری نمائید.

📌 آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☐ به بیمار بیاموزید دارو را کاملاً مطابق تجویز بکار برده و دوز فراموش شده را تنها در صورتی که هم‌اکنون
روز بخاطر آورد مورد استفاده قرار دهد. از دو برابر نمودن دوزهای دارو نیز پرهیز نماید. هنگام انجام تست‌های
آزمایشگاهی یا کنترل بیمار، پزشک باید از دوز حذف شده مطلع شود.

☐ بیمار را از غذاهای غنی از ویتامین K مطلع سازید. بیمار باید از محدودیت در مصرف این غذاها آگاه شود. چون ویتامین
K آنتی‌دوت وارفارین بوده و مصرف این غذاها در طی درمان با وارفارین باعث تغییر و نوسان زمان پروترومبین
می‌گردد.

☐ به بیمار توصیه نمائید بروز هر علامت دال بر خونریزی یا خون‌مردگی غیر معمول (خونریزی از لثه، خونریزی از بینی،
تیرگی رنگ مدفوع، هم‌چوری، افزایش میزان خون قاعدگی) را گزارش نماید.

☐ بر اهمیت انجام تست‌های آزمایشگاهی مکرر جهت کنترل فاکتورهای خونی تأکید نمائید.

📌 مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر ترشح می‌شود. تغذیه با شیر مادر در حین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

VALSARTAN h
Diovan, Valzar

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : آنتاگونیست گیرنده آنژیوتنسین II

• طبقه‌بندی درمانی : ضد هیپرتانسیون

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C (سه ماهه اول)، D (سه ماهه دوم و سوم)

📌 فرآورده‌های ژنریک ایران

Capsules: 80 mg

Capsules: 160 mg

Tablets: 160 mg

📌 اندیکاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

نارسایی قلبی (کلاس II-IV) در بیمارانی که نمی‌توان از مهارکننده‌های ACE استفاده نمود
درمان فشارخون (به تنهایی یا همراه با سایر داروهای ضد هیپرتانسیون)

📌 کنتراندیکاسیونها و موارد احتیاط

● حساسیت مفرط نسبت به دارو.
○ اختلال عملکرد کلیه و کبد.

📌 توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را می‌توان قبل و یا بعد از غذا تجویز نمود.
✓ دارو را در درجه حرارت $15-30^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمایید.

📌 آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ از بیمار بخواهید دارو را دقیقاً مطابق تجویز به کار برده و در صورت فراموش نمودن مصرف یک دو، بلافاصله بعد از به یاد آوردن آن را مصرف کند، و از دو برابر نمودن دوز بعدی خودداری کند.
☒ بیمار می‌تواند دارو را قبل و یا بعد از غذا مصرف نماید.
☒ از بیمار بخواهید در صورت حاملگی، سریعاً به پزشک خود اطلاع دهد.

📌 مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است، با این حال مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.

VERAPAMIL HCl h

Calan, Isoptin

- طبقه‌بندی فارماکولوژیک : مسدودکننده کانال کلسیم
- طبقه‌بندی درمانی : ضد آنژین، ضد هیپرتانسیون، ضد آریتمی
- طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

☞ فرآورده‌های ژنریک ایران

Coated Tablets: 40 mg

Coated Tablets: 80 mg

Sustained Release Film Coated Tablets: 240 mg

Injection: 5 mg/2 ml

☞ اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

آنژین پرنزمتال، واریانت؛ آنژین متغیر یا مزمن؛ آنژین صدری ثابت
کنترل ریت بطنی در بیماران دیژیتالایزه مبتلا به فلوتر یا فیبریلاسیون دهلیزی مزمن
هیپرتانسیون

جلوگیری از تاقیکاردی فوق بطنی پاروکسیسمال راجعه

تاقی آریتمی‌های فوق بطنی

☞ کنترااندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنترااندیکاسیون‌ها: ● حساسیت مفرط ● برادیکاردی سینوسی ● بلوک پیشرفته قلبی ● نارسایی احتقانی قلب.
موارد احتیاط: ○ بیماری‌های کبدی ○ کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک ○ دوران بارداری ○ دوران شیردهی ○ Sick sinus.

☞ توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

- ✓ به منظور کاهش تحریک دستگاه گوارش، دارو را همراه با غذا تجویز کنید.
- ✓ قطع ناگهانی دارو، ممکن است منجر به طولانی شدن زمان درد در افراد مبتلا به آنژین صدری شود.
- ✓ محلول تزریقی باید بدون رنگ و شفاف باشد.
- ✓ تزریق وریدی باید در مدت بیشتر از ۲ دقیقه صورت گیرد.
- ✓ این دارو در هر محلولی که pH بالاتر از ۶ داشته باشد، رسوب می‌کند.
- ✓ دارو را در ظروف مقاوم به نور و درجه حرارت 15-30°C نگهداری کنید.

- اطلاعات کلی:** ☒ به بیمار توصیه نمائید علیرغم احساس بهبودی، دارو را کاملاً مطابق دستور بکار برده و در صورت فراموش نمودن یک دوز، بلافاصله پس از بخاطر آوردن آن را مصرف نماید. مگر اینکه فرصتی تا زمان دوز بعدی وجود نداشته باشد. همچنین از دو برابر نمودن دوز دارو پرهیز نماید و بدون مشورت با پزشک درمان را قطع ننماید، چون بدین منظور کاهش تدریجی دوز دارو ضرورت دارد.
- ☒ به بیمار و خانواده‌اش کنترل روزانه نبض قبل از مصرف دارو را بیاموزید و توصیه نمائید نبض نامنظم یا زیر ۵۰ ضربه در دقیقه را به پزشک گزارش نماید.
- ☒ جهت پیشگیری از هیپوتانسیون ارتوستاتیک به بیمار توصیه نمائید از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نماید.
- ☒ مصرف وراپامیل باعث سرگیجه می‌شود. به بیمار توصیه نمائید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
- ☒ به بیمار توصیه نمائید بروز سردردهای شدید و مقاوم به درمان را به پزشک گزارش دهد.
- آنزین:** ☒ به بیمارانی که به‌طور همزمان تحت درمان با وراپامیل و نیتراتها می‌باشند بیاموزید مصرف هر دو دارو طبق تجویز پزشک ادامه داده و در صورت بروز حملات آنزینی، از نیتروگلیسرین زیرزبانی استفاده نمایند.
- ☒ به بیمار توضیح دهید در صورت عدم بهبود درد قفسه سینه یا تشدید علایم پس از درمان و یا بروز تعریق، کوتاهی نفس همزمان با درد قفسه سینه یا سردردهای شدید و مقاوم به پزشک اطلاع دهد.
- هیپرتانسیون:** ☒ به بیمار و خانواده‌اش شیوه صحیح کنترل هفتگی فشارخون را آموخته و توصیه نمائید بروز تغییرات قابل ملاحظه در فشارخون را به پزشک گزارش نماید.
- ☒ بیمار را به کاربرد سایر شیوه‌های پائین‌آورنده فشارخون (رژیم کم سدیم، ورزش منظم، کاهش وزن، درمان تنش‌ها و قطع سیگار) تشویق نمائید. همچنین توضیح دهید که این دارو درمان فشارخون نیست بلکه تنها قادر به کنترل آن می‌باشد.

مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر ترشح می‌شود. برای جلوگیری از ایجاد عوارض جانبی در شیرخوار، تغذیه با شیر مادر در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

IDOQUINOL (DIIDOXYHYDROXYQUINOLINE) h

Amebaquin, Moebiquin, Yodoxin

• طبقه‌بندی فارماکولوژیک : ۸ - هیدروکسی کینولین ید

• طبقه‌بندی درمانی : ضد آمیب

• طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C

• فرآورده‌های ژنریک ایران

Tablets: 210 mg

• اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

آمیب‌ها

• کنتراندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط

کنتراندیکاسیون‌ها: • حساسیت مفرط نسبت به ۸ - هیدروکسی کینولین‌ها و ترکیبات حاوی ید • بیماری کبدی کلیوی • نوروپاتی اپتیک.
موارد احتیاط: O بیماری‌های تیروئید.

• توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:

✓ دارو را بعد از غذا تجویز نمائید. در صورت اشکال در بلع، می‌توان دارو را خرد و در مایعات دلخواه بیمار حل نمود.
✓ دارو را باید در درجه حرارت 15-30°C نگهداری نمود.

• آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات کلی: ☒ به بیمار بیاموزید، برای به حداقل رساندن تحریک گوارشی، دارو را بعد از غذا میل نماید.
☒ به بیمار بیاموزید در صورت فراموش کردن مصرف یک دوز دارو، به محض یادآوردن آن را مصرف کند، ولی اگر تقریباً زمان مصرف دوز بعدی فرارسیده باشد، از مصرف آن خودداری نموده و دوز بعدی را نیز دو برابر نکند.
☒ به بیمار بیاموزید در صورتی که قادر به بلعیدن قرص نبود، می‌تواند آن را خرد کرده و مصرف کند.
☒ به بیمار توصیه نمائید، علیرغم احساس بهبودی دوره درمان را کامل نماید.

• مصرف در دوران شیردهی

ترشح این دارو در شیر ثابت نشده و عوارضی نیز برای مصرف آن در انسان گزارش نشده است. با این حال منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.